

Aus dem Botanischen Garten der Universität Breslau.

Die Hieracien des Riesengebirges aus den Sektionen Alpina und Alpestris in ihren phylogenetischen Beziehungen zu andern Verwandtschaftskreisen.

Inaugural-Dissertation,

welche

nebst den beigefügten Thesen

mit Genehmigung der hohen

philosophischen Fakultät der Königl. Universität Breslau


zur

Erlangung der philosophischen Doktorwürde

am Donnerstag, den 6. Juli 1905, vormittags 11 Uhr,

in der Aula Leopoldina der Universität

öffentlich verteidigen wird



Ernst Benner.

Opponenten:

Stud. rer. nat. **Conrad Kiesewalter,**

Cand. med. **Arthur Knick.**

Breslau

Buchdruckerei H. Fleischmann

1905.

Gedruckt mit Genehmigung der hohen philosophischen Fakultät der
Kgl. Universität Breslau.

Referent: Prof. **Dr. Pax.**

Meinen Eltern!



Digitized by the Internet Archive
in 2026

In der vorliegenden Arbeit soll in erster Linie der phylogenetische Zusammenhang der einzelnen Sippen aus der Gruppe der Alpina und Alpestrina unter einander und mit andern Verwandtschaftskreisen näher erörtert werden. Dass in der Gattung *Bastarde* zur Ausbildung kommen, haben schon Schultz und namentlich Mendel und Nägeli-Peter festgestellt¹⁾. Andererseits haben in neuerer Zeit Ranukiaer und Ostenfeld für eine grössere Zahl von *Compositae* und Ostenfeld besonders für einige *Hieracien* den Nachweis geführt, dass sich diese Pflanzen auf parthenogenetischem Wege zu entwickeln vermögen²⁾. *Bastarde* können nun natürlich nicht parthenogenetisch entstanden sein, und somit folgt aus den Untersuchungen, dass die normale Embryoentwicklung und die Parthenogenesis nebeneinander bestehen.

De Vries³⁾, der sich nach dem Ursprunge neuer Arten fragt, kommt zu dem Resultat, dass sie entweder durch plötzliches Auftreten eines vorher nie beobachteten Merkmales, das fortan konstant bleibt, die Mutation, entstehen,

¹⁾ Vergl. hierzu die kürzlich erschienene Abhandlung: C. Correns Gregor Mendels Briefe an Carl Nägeli. Abh. math. phys. Kl. sächs. Ges. Wiss. Leipzig XXIX (1905) p. 189.

²⁾ C. Ranukiaer in Botanisk Tidsskrift, Vol. 25, p. 109—140 C. Ranukiaer u. C. H. Ostenfeld, ebenda p. 409—413; C. H. Ostenfeld, Zur Kenntnis der Apogamie in der Gattung *Hieracium* in Berichte der Deutschen Botanischen Gesellschaft 1904, p. 376—381 u. 537—541; Zahn, Bemerkungen über C. H. Ostenfelds Artikel Zur Kenntnis der Apogamie in der Gattung *Hieracium*, in Allgemeine Botanische Zeitschrift, X (1904), p. 170—172.

³⁾ H De Vries, Die Mutationstheorie. 1901.

oder auch in einigen Fällen durch Bastardbildung, nie aber durch fluktuierende Variabilität oder Selektion. Die Variabilität wirkt immer nur in einem $\pm$ der Ausbildung, ist linear, bildet also ein oder einige Charaktere der Pflanze weiter aus oder lässt sie allmählig schwächer werden und neigt oft zu Rückschlägen, während die Mutabilität durch sprungweise Neubildung von Artcharakteren, die nach allen Seiten hin divergieren können und häufig in grösserer Zahl zugleich auftreten, und durch nur selten zustande kommende Rückschläge gekennzeichnet ist. Die lineare Variabilität hat durchaus Grenzen, ein $\pm$ der Abweichung kann nicht überschritten werden, die Mutabilität ist an keine festen Regeln gekettet, sondern bildet neue Individuen auf ganz planlose Weise. Die Selektion tritt natürlich auch in ihre Rechte, aber nicht dadurch, dass sie neue Arten bildet, sondern nur dadurch, dass sie das den Verhältnissen nicht oder nur schlecht Entsprechende ausschaltet.

Die Schwierigkeit, was man nun als Variation oder Mutation aufzufassen hat, beruht in der überaus heikeln, dem Takte des Einzelnen zu überlassenden und vielfach wahrscheinlich überhaupt nicht zu lösenden Frage, welche Eigenschaften man als Artcharaktere anerkennen will, und ferner darin, dass die Variabilität nur allzu oft zu Formen führt, die ihrem Aussehen nach einer durch Mutabilität entstandenen guten Art gleichen oder Mittelformen zwischen zwei andern sind und dann fälschlich als Bastarde gedeutet werden. H. de Vries sieht als einzige Lösung dieser letzten Schwierigkeiten das Experiment an, gibt aber zu, dass bei den Gattungen, in denen die Variabilität eine grosse Rolle spielt, die Untersuchungen am schwersten zum Ziele führen können, vielleicht überhaupt nie befriedigenden Abschluss finden werden.

Der zweite Band der de Vries'schen Mutationstheorie umfasst die Bastardbildungen. Ein hervortretender Gedanke spricht sich in dem Satze aus, dass Sicherheit für die Bestimmung von Bastarden auch nur durch das Experiment erreicht werden kann. Dem Gedankengange des Buches

genauer zu folgen, würde hier zu weit führen; es muss nur erwähnt werden, dass Bastarde von zwei Sippen keineswegs eine Mittelsippe ergeben müssen. Denn nur in sehr wenigen Fällen sind nach den angestellten Versuchen die Bastarde wirkliche Mittelsippen, intermediäre Bastarde, meist sind sie goneoklin, d. h. sie neigen in ihrer Ausbildung mehr dem Vater oder der Mutter zu, freilich nur selten so stark, dass sie zu sogenannten einseitigen Bastarden werden. Die Tatsache, dass die goneoklinen Bastarde die häufigsten sind, muss im Folgenden besondere Berücksichtigung finden.

Ich kann mich der Ansicht von De Vries über die Entstehung der Arten nur teilweise anschliessen. Vor 10 bis 20 Jahren war man der Ansicht, dass nichts neues anders als durch Zuchtwahl im Sinne Darwins entstehe; jetzt neigen sehr viele Forscher der Ansicht zu, dass allein die Mutabilität die Möglichkeit zur Entstehung neuer Arten biete. Ich halte das für verfehlt; ich neige vielmehr dazu, für die Entstehung neuer Arten nicht allein die Mutabilität und Bastardierung, sondern auch die fluktuierende Variabilität anzuerkennen, indem bei jeder Entstehungsweise die Selektion ihre Auslese hält.

Denn nach den beobachteten Tatsachen über die Stärke der Variabilität der Hieracien erscheint der Schluss, dass diese Pflanzen an ihren natürlichen Standorten variieren, unabweisbar. Man braucht nur ein alpines Hieracium in den Garten zu pflanzen, so verändert es sich, oft sogar so stark, dass der ursprüngliche Typus kaum noch wiederzuerkennen ist. Bei derartigen Kulturversuchen haben zur Variation jedenfalls Veränderungen des Untergrundes und besonders des Klimas beigetragen, also Veränderungen in der Ernährung im weiteren Sinne. Dieselben Faktoren wirken aber auch in der freien Natur. Eine Veränderung im Substrat oder die Verbreitung einer Art aus geschützteren Lagen in rauhere, wie etwa aus einem Felskessel oder gar aus der oberen Waldregion auf die Höhe des Kammes, müssen Variation zur Folge haben. Damit im Einklange steht die Tatsache, dass Felskessel oder Hochtäler besonders sippenreich sind;

denn es ist anzunehmen, dass einerseits verschiedene Sippen aus der oberen Waldregion in jene für sie klimatisch ungünstigeren Kare oder Hochtäler hinauf verschleppt werden, andererseits verschiedene Sippen von dem höher gelegenen Kamme sich wieder zurückverbreiten konnten.

Geschichte der Hieracienforschung im Riesengebirge¹⁾.

Nachdem Graf Sternberg das erste endemische west-sudetische Hieracium unter dem Namen *H. sudeticum* beschrieben hatte²⁾, unterblieben weitere Veröffentlichungen, bis 10 Jahre später der Prager Professor Ignaz Tausch mit einer grösseren Arbeit hervortrat³⁾. Dieser folgten noch andere⁴⁾ über den gleichen Gegenstand, die sich sämtlich durch grosse Schärfe der Beobachtung und Feinheit der Unterscheidung schwieriger Formen auszeichnen.

Als Zeitgenossin von Tausch muss Josephine Kablik, Apothekersgattin in Hohenelbe, genannt werden. Zu einer Zeit, zu der die naturgeschichtliche Durchforschung des Gebirges wie überhaupt die Bereisung der noch unwegsamen Berge auf grosse Schwierigkeiten stiess, erwarb sich J. Kablik, die auf zahllosen Excursionen bis aufs Hochgebirge hinauf das Riesengebirge zum Zwecke botanischer und geologischer Studien durchstreifte, besondere Verdienste dadurch, dass sie ihre Funde in liberalster Weise an andere Forscher verteilte. So hat sie auch an der Durchforschung der schlesischen Flora einen hervorragenden Anteil genommen. Ihr in der Bücherei des kgl. botanischen Gartens aufbewahrter

¹⁾ Ausführlicher dargestellt bei G. Schneider in Das Riesengebirge in Wort und Bild VIII, 1838, p. 76—80.

²⁾ Denkschriften der kgl. bairischen botanischen Gesellschaft zu Regensburg, 1818, p. 62.

³⁾ Flora XI. Regensburg 1828, Ergänzungsblätter zum 1. Bande, p. 49—81.

⁴⁾ Flora XX 1837. Beiblätter No. 5, p. 67—71.

wissenschaftlicher Briefwechsel mit hervorragenden Vertretern der Naturwissenschaften ihrer Zeit lässt erkennen, dass alle ihre freien Stunden, die ihr neben der Erfüllung der Pflichten als Gattin und Mutter blieben, der Wissenschaft gewidmet waren.

Hervorragende Verdienste erwarb sich Friedrich Wimmer. Das zuerst von ihm in Gemeinschaft mit C. Chr. Guenther u. H. Grabowski im Jahre 1824 herausgegebene Verzeichnis der schlesischen Pflanzen fand in der später erschienenen Flora¹⁾ eine Erläuterung und Erweiterung. Aber erst Wimmers Flora von Schlesien²⁾ trug wesentlich zur Kenntnis der Hieracien bei und bildet zusammen mit den Arbeiten von Tausch den Grundstein, auf dem weitere Forschungen sich aufbauen konnten.

Bald nach dem Tode Wimmers begann eine rege Tätigkeit auf dem Gebiete der Hieracienkunde. Besonders verdienen genannt zu werden L. Čelakovský, Engler, E. Fiek, Freyn, Fritze, Knaf, H. Krause, F. Pax, K. Polák, Purkyně, G. Schneider, Siegert, R. von Uechtritz und J. Velenowský. Von all den genannten Forschern kommt aber das Hauptverdienst Rudolf von Uechtritz zu. Das Endergebnis seiner jahrelangen Arbeiten findet sich in der Flora von Fiek³⁾ niederlegt. Die letzte grössere Arbeit ist die sorgfältige Monographie der westsudetischen Hieracien von G. Schneider⁴⁾. Sie bildet

¹⁾ Fr. Wimmer u. H. Grabowski, Flora Silesiae. Vratislaviae 1827—1829.

²⁾ Fr. Wimmer, Flora von Schlesien. Berlin 1832; Breslau Ratibor u. Pless 1840; Breslau 1844; Breslau 1857 und Fr. Wimmers neue Beiträge zur Flora von Schlesien. Breslau 1845.

³⁾ E. Fiek, Flora von Schlesien. Breslau 1881.

⁴⁾ Erschienen in Riesengebirge in Wort und Bild. Marschendorf VIII, 1888, p. 75—80, 110—114; IX, 1889, p. 18—24, 54—59, 83—100, 147—152; X, 1890, p. 21—31, 69—71; XI, 1891, 1 u. 2 p. 30—35, 3 u. 4 p. 21—28; XII, 1892, 1 u. 2 p. 23—25, 3 u. 4 p. 65—68; XIII, 1893, 1 u. 2 p. 20—23, 3 u. 4, p. 20—29; XIV, 1894, 1 u. 2 p. 21—28, 3 u. 4 p. 65—68; XV, 1895, 1 u. 2. p. 17—21. Die Arbeit wird weiterhin abgekürzt R. W. B.

den Abschluss längerer Untersuchungen, die, anfänglich von Uechtritz unterstützt, später von Schneider selbständig fortgeführt wurden. Das Endresultat, zu dem Schneider gelangt, weicht vielfach von den Ergebnissen seiner früheren Arbeiten und denen seines Vorgängers ab; aber weil es nicht nur auf die älteren Forschungen von Tausch und Wimmer, sondern gerade auch auf die neueren Untersuchungen von Uechtritz und die seit 1881 erschienenen Abhandlungen gegründet werden konnte, musste in der vorliegenden Arbeit besonders darauf Bezug genommen werden.

Den Stoff zu den folgenden Untersuchungen lieferte das überaus reichhaltige Herbarium des kgl. botanischen Gartens zu Breslau, in dem neben vielen Originalexemplaren verschiedener Forscher besonders auch eine grosse Zahl der von Tausch, Wimmer, Uechtritz, Schneider und Pax gesammelten Sippen aufbewahrt wird, ferner das schlesische Herbarium, das Herbarium E. Fiek und schliesslich das Material, das ich selbst auf einer zehntägigen, lediglich dem Studium der Hieracien gewidmeten Reise in das Riesengebirge und einer Excursion des Prof. Pax nach dem mährischen Gesenke zusammenbrachte.

Morphologischer Teil.

In der vorliegenden Arbeit werden nur Hieracien des schlesisch-böhmischen Riesengebirges in betracht gezogen. Natürlich müssen öfter, besonders wenn Standortsverhältnisse in Frage kommen, andere Gebiete zum Vergleich herangezogen werden, aber es liegt nicht im Bereiche dieser Arbeit, Lokalformen aus anderen Gebieten eingehender zu besprechen.

In Bezug auf die zur Unterscheidung der einzelnen Sippen verwandten Merkmale sei folgendes vorausgeschickt. Die vielfach betonte Färbung der Organe hat wenig Berücksichtigung gefunden, weil sie wenig konstant und noch weniger objektiv ist. Für die Blattfarbe des *H. glandulosodentatum* z. B. wird „freudig grün“ vom Autor angegeben;

meistens mag das stimmen, aber in dem trockenen Sommer 1904 wiesen von 16 gesammelten Individuen 15 deutlich glaucescierende Blattfarbe auf, so stark, dass die Blätter denen von *H. Schmidtii* fast glichen. Auch die Farbe der Griffel ist ein unzuverlässiges Merkmal und auf die Färbung der Achänen innerhalb der einzelnen Gruppen nicht allzu viel zu geben. Oder wenn *H. erythropodum* stets braun bis schmutzigviolett angelaufenen Stengel im unteren Teile aufweist, so ist das für die Unterscheidung gegen andere Sippen ohne jeden Wert, denn das kommt eben auch bei diesen zuweilen vor. Die rötliche Fleckung des Stengels des *H. chlorocephalum* ist schon etwas deutlicher.

Die Behaarung der Hieracien galt von jeher als ausschlaggebend für die systematische Stellung; sie findet trotzdem nur in beschränkten Grenzen Verwendung. Einmal wird die Behaarung in fast allen Diagnosen nur im Allgemeinen angegeben, Ausnahmen werden stets anerkannt; das andere Mal ist es eine bekannte Tatsache, dass das Indument sehr stark vom Substrat abhängt. Pflanzte man zum z. B. ein Hieracium auf Kalkboden, so vermindert sich allmählich seine Drüsenhaarbekleidung.

Die hier zu behandelnden Hieracien gestatten in ihrer Behaarung tatsächlich nur wenige deutliche Unterscheidungen. Denn fast überall weisen die konstruierbaren Reihen so dichte Besetzung auf, dass eine Form von ihrer Nebenform oft nur sehr schwer unterscheidbar ist; erst wenn wir eine Anzahl Zwischenformen überspringen, nimmt das Indument einen wirklich andern Charakter an. Im allgemeinen gilt von den drei Trichomkategorien der Hieracien, den Borsten- oder Zottenhaaren, den Drüsen- oder Köpfchenhaaren und den Flocken-, Flaum- oder Sternhaaren, folgendes. Die Zottenhaare treten am reichsten auf bei *H. alpinum* und dessen nächsten Verwandten; die Drüsenhaare herrschen bei *H. murorum*, *vulgatum* und besonders *prenanthoides* vor; die Flockenhaare, bald sternartig, bald flaumig ausgebildet, treten bei allen Sippen am dichtesten an den Köpfchenstielen auf, reichen bei den Alpinis fast nie bis auf die Hüll-

schuppen, bei den andern Sippen meist, je weiter von *H. alpinum* entfernt, mit zunehmender Stärke. Am schwächsten ist das Indument im allgemeinen bei *H. Engleri*, *chlorocephalum*, *caesium* und oft auch bei *vulgatum* und den ihm nächst stehenden Sippen ausgebildet. Es soll gleich hier vorausgeschickt werden, dass der im Folgenden den Sippen zugeschriebenen phylogenetischen Stellung die Ausbildung des **Haarkleides nicht widerspricht**.

Die Grösse der Köpfe ist für die einzelnen Sippen ein wichtiges Unterscheidungsmerkmal. Wenn von ihr gesprochen wird, so ist freilich stets an eine normale Mittelform, wenn nicht ausdrücklich anders vermerkt, gedacht. Bei einer Zwerg- oder Riesenform wird eben die relative Grösse ausschlaggebend sein müssen. Die zuweilen vorkommenden Individuen mit winzigen Köpfen, die sog. „*formae microcephalae*“, haben keine besondere Berücksichtigung gefunden, weil ihre Entstehung durch gelegentliche, ungünstige Verhältnisse bedingt zu werden scheint. So machte mich Prof. Pax darauf aufmerksam, dass z. B. bei *H. murorum* f. *microcephalum* an den Blättern fast ausnahmslos eine *Puccinia* zu beobachten ist, und daher möglichenfalls die Ausbildung der Microcephalie auf parasitären Einfluss zurückgeführt werden kann, wiewohl exakte Versuche diese Annahme erst bestätigen müssen.

Sämtliche hier zu behandelnde Sippen der Hieracien sind mit einander meist so eng verknüpft, dass sie sich auf kontinuierlichen oder gleitenden Reihen unterbringen lassen. Eine Hauptart in dem Sinne einer isolierten Form erscheint demnach für unsere Pflanzen ausgeschlossen. Wenn dennoch von Hauptarten gesprochen wird, so kann sich das nur auf solche Sippen beziehen, welche die Charakteristika, die in einer ganzen Gruppe zu beobachten sind, in möglichst vollkommener und konstanter Gestalt aufweisen, so dass man zu dem Schlusse berechtigt ist, dass solche Sippen einerseits zum Ausgangspunkte verschiedener anderer geworden sind, deren Variations- oder Mutationsbasis oder Bastardeltern darstellen, andererseits ein verhältnismässig hohes Alter haben.

Ich rechne zu dieser Gruppe: *H. alpinum*, *tubulosum*, *murorum*, *caesium*, *vulgatum*, *chlorocephalum* und *prenanthoides*.

Alle Sippen, die den genannten Anforderungen nicht so vollkommen oder nur in geringem Masse genügen, nenne ich Zwischenformen. Unter ihrer naturgemäss grösseren Zahl kann man wieder solche erkennen, die, durch verhältnismässige Konstanz ihrer Eigenschaften und infolgedessen wahrscheinlich auch durch ziemlich hohes Alter gekennzeichnet, zu sog. guten Arten geworden sind. Sie unterscheiden sich also von den Hauptarten nur dadurch, dass sie entweder ihre Bastardnatur morphologisch noch ziemlich klar zeigen, oder dass sie gegenüber bestimmten Hauptarten, denen sie nahe stehen, an Individuenzahl immerhin so sehr in den Hintergrund treten, dass man als die Urform, die Hauptart, füglich nicht sie betrachten darf. Sie sind aber jedenfalls als gute Arten zu bewerten. Ich rechne zu dieser Gruppe: *H. bohemicum*, *pedunculare*, *polymorphum*, *atratum*, *nigritum* und *Wimmeri*.

Die andern Zwischenformen sind solche, die den Rang von guten Arten noch nicht erworben haben, weil sie entweder nicht genügend häufige Hybriden oder Variationen sind. Ich zähle dieser Gruppe zu: *H. albinum*, *nigrescens*, *glandulosodentatum*, *riphaeum*, *Engleri*, *pseudalbinum*, *erythropodum*, *corconticum*, *asperulum*, *eximium*, *decipiens*, *dubiosum*, *pseudodecipiens*, *Sagorskii*, *pseudeximium*, *Pseudo-Wimmeri*, *corruptum* und *intermedium*.

Es ist eine merkwürdige Tatsache, dass die grösste Zahl der im Riesengebirge aufgefundenen Sippen, mögen sie als gute Arten zu bewerten sein oder nicht, für das Riesengebirge endemisch ist, obwohl die gleichen vermeintlichen Stammeltern grösstenteils auch in andern Gebirgen Europas auftreten. Dadurch könnte die Deutung solcher Sippen als Bastarde erschüttert werden, denn es ist von vorn herein nicht einzusehen, weshalb in aussersudetischen Gebieten Bastarde fehlen sollten. Dieser Einwand aber lässt sich dadurch entkräften, dass wohl in keinem zweiten Gebirge Mitteleuropas, höchstens mit Ausnahme des mährischen Ge-

senkes, die Individuenzahl der alpinen Hieracien eine so überraschend grosse ist wie im Riesengebirge, wo während des Hochsommers weite Strecken in den Hieracien die Hauptvertreter der Vegetation zeigen. Dazu kommt ferner, dass die Stammarten in andern mitteleuropäischen Gebirgen meist in anderer Ausbildung erscheinen, sodass demnach Bastarde zweier Arten in den verschiedenen Gebirgen ein verschiedenes Aussehen besitzen müssen. Auf diese Tatsache wird später noch einmal eingegangen werden, um zu zeigen, dass z. B. *H. coronticum* und *asperulum* in den Alpen ihren Ersatz finden in *H. juranum*, in den Karpaten in *H. pocuticum*.

A. Besprechung der einzelnen Sippen.

a) Die Hauptarten.

1. *Hieracium alpinum* L. Schon die älteren Floren von Schlesien erwähnen das *H. alpinum*, doch kennen sie eine Anzahl anderer Sippen, die vergesellschaftet mit ihm auftreten, noch nicht. Als nun in der Flora von Wimmer und Grabowski verschiedene solcher Sippen Aufnahme fanden, wurden sie zunächst als Varietäten von *H. alpinum* gedeutet¹⁾. Erst in der letzten Wimmer'schen Flora finden sich die teilweise jetzt noch anerkannten Varietäten α) *genuinum*, β) *melanocephalum*, γ) *foliosum* angeführt²⁾. Die von R. von Uechtritz verfasste oder wenigstens ganz in seinem Sinne gehaltene Bearbeitung der Hieracien in Fieks Flora weicht in Bezug auf *H. alpinum* von der letzten Wimmer'schen Einteilung wieder ab³⁾, doch die „Monographische Bearbeitung der Hieracien der Westsudeten“ von G. Schneider nimmt die alte Gliederung unter der Bezeichnung Varietät wieder auf, und jede der Varietäten wird in eine Anzahl Unterformen gespalten, sodass *H. alpinum* hier 3 Varietäten mit zusammen 12 Unterformen in sich schliesst⁴⁾.

¹⁾ Wimmer et Grabowski, Flora Silesiac III, 1829, p. 177.

²⁾ Wimmer, Flora von Schlesien, 1857, p. 306.

³⁾ Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 267.

⁴⁾ R. W. B. XI, 1891, 1 u. 2 p. 32/33.

Es entsteht nunmehr die Frage, inwieweit diese Einteilung, welche das Endergebnis einer langen Forschungsperiode darstellt, eine streng wissenschaftliche Auseinandersetzung der Formen überhaupt gestattet, oder welche Unterformen wieder besser zu vereinigen sind. Sowohl die Diagnosen der var. *genuinum* und *melanocephalum*, als auch das von Schneider bestimmte Material des Breslauer botanischen Gartens bringen die Ueberzeugung, dass es sich hier um zwei tatsächlich trennbare Ausbildungsformen handelt; dagegen ist die var. *grande* nur sehr schwer abzugliedern: sie hat Eigenschaften von *genuinum* und *melanocephalum*, im allgemeinen mehr von *melanocephalum*; immer ist sie aber etwas grösser und robuster ausgebildet, und die bei var. *genuinum* gar nicht oder nur schwach, bei *melanocephalum* schon stärker auftretenden Merkmale wie Dicke des Stengels, Zahl der Grundblätter, Entwicklung der Stengelblätter, Zähnelung der Blätter und Drüsenhaarbekleidung, erreichen bei *grande* ihre stärkste Ausbildung oder stehen mindestens der bei *melanocephalum* an Stärke nicht nach. Dieser in der kraftvollen Entwicklung beruhende Hauptunterschied gegen die var. *genuinum* und *melanocephalum* dürfte nur auf Standortsverhältnisse zurückzuführen sein, was übrigens durch eine Bemerkung Schneiders selbst nahe gelegt wird. Er sah die var. *grande* an der Stelle eines verrotteten Rinderexkrementes hervorspriessen, während in allernächster Nachbarschaft vier typische *melanocephalum* standen¹⁾. Wenn Schneider an einer Stelle²⁾ die var. *grande* in ihrer typischen Ausbildung eine Zwischenform von *H. alpinum* und *calenduliflorum* Backh. (= *eximium* var. *calenduliflorum*) nennt, so meint er damit jedenfalls nicht, dass es sich um einen Bastard, sondern nur, dass es sich um eine Varietät handle, die von *H. alpinum* ausgehend, an *calenduliflorum* erinnert.

¹⁾ G. Schneider: „Mitteilungen über die Hieracien des Riesengebirges“ in „Oesterreichische Botanische Zeitschrift“ 1887, p. 203 (fernerhin abgekürzt Ö. B. Z.) und R. W. B. XI, 1891, 1 u. 2. p. 35.

²⁾ R. W. B. XI, 1891, 1 u. 2 p. 34.

Was nun die Formen von *genuinum* und *melanocephalum* betrifft, so wird den systematischen Wert der Scheidung am besten die bei Schneider gegebene Tabelle erweisen¹⁾. Jeder muss zugeben, dass eine gewaltige Arbeitsmenge erforderlich war, ehe ein derartiges System durchgeführt werden konnte, und doch wird man sich nicht verhehlen dürfen, dass auch dem Hieraciumkenner ausserordentliche Schwierigkeiten erwachsen, wenn er die gesammelten Formen nach der Schneider'schen Gliederung einordnen soll — mit Ausnahme von *stylösium*. Uebrigens betont Schneider selbst den geringen systematischen Wert der beschriebenen Varietäten und Unterformen.

In der Tabelle für *var. genuinum* kann beispielsweise jede der 4 Unterformen (1) *typicum* 2) *albovillosum* Froel. 3) *nigrosetosum* G. Schnd. 4) *setulosum* G. Schnd. einen Stengel von 9—10 cm Höhe haben, der bei allen ausserdem dünn sein kann, und Kopfhüllen von 11—14 mm Länge. Ferner ist das erste Stengelblatt bei der 1., 2. und 4. Form gleichgestaltet, während die 3. Form einen Unterschied, doch einen meist nur sehr geringen, aufweist. Was die Farbangaben über die Hüllschuppen betrifft, so ist dieses Merkmal vielleicht das unzuverlässigste, denn bei so verwandten Farbentönen wie schwärzlichgrün, schwarz und tiefschwarz kommt es lediglich auf die rein subjektive Empfindung des Beschauers an, die ein objektives Urteil ausschliesst. Dagegen weist die Zusammenstellung über die Behaarung deutlichere Merkmale auf, aber auch hier kann keine sichere Grenze gezogen werden, denn die Worte „Behaarung im allgemeinen“ lassen unzweideutig Uebergänge zu.

Aehnlich verhält es sich mit der Tabelle für *var. melanocephalum*. Hier kann die Stengelhöhe bei den 4 ersten Formen (1) normale 2) *sericeum* G. Schnd. 3) *aterrimum* G. Schnd. 4) *nivale* Velen.) 14—18 cm, die Länge der Kopfhüllen 13—17 mm betragen und das unterste Stengelblatt fehlen, dann also keinerlei Merkmale abgeben. Für

¹⁾ R. W. B. XI, 1891, p. 33.

die Bezeichnung der Hüllschuppenfarben gilt das Gleiche wie oben, die Behaarungsunterschiede lassen sich auch hier nur „im allgemeinen“ anführen. Der Stengel kann bei der 1., 2. und 4. Form verbogen sein, der 3. dagegen wird ein steif aufrechter Stengel zugeschrieben.

Die 5. Form der Tabellen, *stylosum*, unterscheidet sich jedoch von den je 4 andern deutlich durch die stylöse Ausbildung der Blüten: welcher Wert der Stylosität zukommt, wird später noch erörtert werden.

Von *Hieracium alpinum* sind nach den hier geäußerten Ansichten also 2 Varietäten, deren jede stylöse Blüten hervorbringen kann, zu unterscheiden. Aber auch Uebergänge zwischen den Varietäten treten zuweilen auf. In solchen Fällen ist die Schreibweise „*genuinum* — *melanocephalum*“ vollkommen ausreichend und viel klarer als neue Namen.

2. *Hieracium tubulosum* Tsch.¹⁾ ist eine Sippe, die schon vom Entdecker für eine eigene Art gehalten wird, denn sie „zeigt durchaus keine Abänderung“. Es erscheint nicht nötig, diese Spezies durch sämtliche spätere Florenausgaben zu verfolgen; es mag vielmehr die Erwähnung genügen, dass Wimmer und Grabowski diese Sippe als *H. alpinum inapertum* bezeichneten, dass sie in der letzten Wimmerschen Flora unter dem Namen *hebetatum* als eine untergeordnete Form von *H. alpinum*, gewiss mit Unrecht, aufgeführt wird²⁾, und dass sie Uechtritz als Varietät von *H. alpinum* auffasst⁴⁾. Die Selbständigkeit des *H. tubulosum* als Art wurde zuerst wieder betont von Pax³⁾ und später von G. Schneider⁵⁾. Dieser unterscheidet dort 4 Unterformen und in seiner für uns wichtigsten Monographie⁶⁾ die Formen 1) normale 2) *latifolium* 3) *angustifolium* 4) *villosissimum* Sagorski 5) *calvescens* 6) *stylosum* W. Gr. ex p.

1) Flora, XX. Jahrg. I. Band, 1837, p. 68.

2) Wimmer, Flora von Schlesien, 1857, p. 306.

3) Fick, Flora von Schlesien, 1881, p. 267.

4) F. Pax, Flora des Rehhorns bei Schatzlar, 1883, p. 44.

5) Ö. B. Z. XXXVII. Jahrg. 1887, p. 204.

6) R. W. B. XI, 1891, 3 u. 4 p. 21/22.

Die Flora von Schube stellt, wie aus dem Drucke zu ersehen ist, die Selbständigkeit des *H. tubulosum* in Frage¹⁾, aber in der vorliegenden Arbeit wird der Ansicht von Tausch, Pax und Schneider beigelegt. *H. tubulosum* ist zweifellos dem *H. alpinum* verwandt, aber das typische *tubulosum* hat sich doch ziemlich extrem entwickelt und zeigt vor allem Beständigkeit in seinen Merkmalen. Deshalb darf man *H. tubulosum* als eine gute Art betrachten. Und wenn besonders kleine Individuen noch manchmal lebhaft in ihrem Habitus an *H. alpinum* erinnern, so hat man hier vielleicht ein Beispiel für lineare Variabilität vor sich, die, sowohl von *H. alpinum* als auch von *tubulosum* ausgehend, zu habituell sehr ähnlichen, kaum oder garnicht unterscheidbaren Formen führt. Man betrachtet deshalb am sichersten Formen von *alpinum*-Habitus mit tubulösen Blüten als Variationen von *H. tubulosum*.

Weil zwischen tubulösen und offenen Blüten hier keine deutlichen Uebergänge bestehen, so ist für *H. tubulosum* die Entstehung durch Mutation aus *H. alpinum* die wahrscheinlichste. Denn eine durch blosses Variieren entstandene Pflanze muss auch in einzelnen Individuen auftreten, die Uebergänge zwischen beiden Blütenformen zeitigen.

Nun kommt es bekanntlich vor, in Kulturen nicht allzu selten²⁾, im Freien aber sehr selten, dass sich die Ligulae aufrollen und so eine Zungenblüte entsteht. Es sind sogar nach mündlicher Mitteilung von Professor Pax von ihm am Kiesberge Individuen von *H. tubulosum* gefunden worden, die an demselben Stocke ein Köpfchen mit Röhren-, ein anderes mit Zungenblüten trugen.

Ist man nun geneigt, die Köpfchen mit Zungenblüten wegen ihrer Seltenheit als Belege für ausnahmsweises Auftreten eines Rückschlages zu betrachten, so muss man sich doch fragen, ob die Verhältnisse nicht gerade umgekehrt

¹⁾ Schube, Flora von Schlesien, 1904, p. 416.

²⁾ Vergl. G. Schneider in Ö. B. Z. XXXVII. Jahrg., 1887, p. 204.

liegen, d. h., ob nicht die tubulösen Blüten die ursprünglichen sind und das Auftreten eines Köpfchens mit Zungenblüten auf einen Fortschritt in der Entwicklung deutet. Und das scheint sich tatsächlich nach neueren Untersuchungen¹⁾ deutlich zu bestätigen. Und wenn man *H. tubulosum* an seinen natürlichen Standorten beobachtet, so scheint die Möglichkeit, dass es eine ältere Sippe als *H. alpinum* ist, nicht ohne weiteres zurückweisbar zu sein. *H. tubulosum* bevorzugt im allgemeinen tiefere Lagen als *H. alpinum* und zeigt dort auch meist sehr kräftiges Wachstum; steigt es dagegen in höhere Lagen, so wird es gewöhnlich, falls ihm nicht Knieholzbüsche Schutz gewähren, sehr niedrig, bildet somit die erwähnten habituellen Annäherungsformen an *H. alpinum*. Man könnte daher annehmen, dass *H. alpinum* durch Mutation aus *H. tubulosum* entstanden sei und zu dieser Mutation die veränderten klimatischen Verhältnisse der äussere Anlass waren, während sich in tieferen Lagen die Stammform (*tubulosum*) noch zu erhalten vermochte.

Diese Erklärung ist mit gewichtigen Gründen kaum anfechtbar, aber doch keineswegs erforderlich. Denn die oben vorgetragene Ansicht über die Entstehung des *H. tubulosum* als Mutation von *H. alpinum* braucht eben nur dahin gedeutet zu werden, dass sie als Rückschlagsmutation aufzufassen sei; so kommt die Forderung, die die Röhrenblüten als die phylogenetisch älteren aufgefasst wissen will, nicht minder zu ihrem Rechte. Auch ist es zu auffällig, dass in der Kultur *H. tubulosum* gerade so oft Formen mit Zungenblüten, wie sie *alpinum* aufweist, hervorbringt. Und wenn man die überaus grosse Individuenzahl von *H. alpinum* der von *H. tubulosum* entgegensetzt und das Fehlen des letzteren in andern europäischen Gebirgen und die vielen Annäherungen anderer Riesengebirgssippen gerade an *H. alpinum* berücksichtigt, so nimmt doch die Anschauung

¹⁾ M. von Uexküll-Gyllenband, Die Polygamie der Blütenformen und der Geschlechterverteilung bei den Compositen in *Bibliotheca Botanica*, herausgegeben von Lucrassen, Band X, Heft 52, 1901.

von der Entstehung des *H. tubulosum* aus *alpinum* die grossere Wahrscheinlichkeit für sich in Anspruch.

Die Unterformen, die G. Schneider unterscheidet, leisten der genauen Charakterisierung der Spezies keine Hülfe. Es ist nicht nötig, die Einteilung¹⁾ einer genaueren Besprechung zu unterziehen, denn einerseits gibt die gewählte Nomenklatur schon kurz die Hauptmerkmale der Formen an, anderseits sind unter diesen letzten überdies meist Uebergänge vorhanden, die dann eine sichere Unterordnung gar nicht mehr zulassen oder einige (*villosissimum* und *calvescens*) stellen sogar nur in manchen Jahren erscheinende, wahrscheinlich von der Witterung vollkommen abhängige Formen dar. G. Schneider selbst betont den geringen systematischen Wert der Einteilung.

Die Blüten von *H. tubulosum* zeigen neben der normalen Ausbildung, die hier die tubulose ist, stylose und jene bereits erwähnte, im Freien nur ausnahmsweise vorkommende Zungenblütenausbildung. In anbetracht dieses letzten Auftretens erscheint es gleichwohl nicht erforderlich, eine besondere Form zu unterscheiden, da es sich nach dem Gesagten höchstens um einen Anlauf zu einer Neubildung, wahrscheinlich aber um einen Rückschlag auf *H. alpinum* handelt.

3. *Hieracium murorum* L., 4. *H. caesium* Fries, 5. *H. vulgatum* Fries, 6. *H. prenanthoides* Vill. sind Sippen, die zweifellos als Hauptarten aufzufassen sind. Auch sie zeigen sämtlich Variation, so dass es den Autoren unumgänglich erschien, von jeder Art Varietäten oder Unterformen zu unterscheiden, um eine unzweideutige Bestimmung zu ermöglichen. Eine Durchsicht der verschiedenen Varietäten und Formen liegt aber nicht im Bereiche dieser Arbeit. Wenn daher im folgenden von der Besprechung jener Hauptarten abgesehen wird, so muss nur bemerkt werden, dass ihre Kenntnis im allgemeinen auch genügt, weil die Varie-

¹⁾ R. W. B. XI, 1891, 3 u. 4 p. 22.

täten und Unterformen keinen wesentlichen Einfluss auf die Stellung der hier noch zu besprechenden Sippen ausüben.

7. *Hieracium chlorocephalum* Wimm. Als letzte hierher gehörende Art ist *H. chlorocephalum* Wimm.¹⁾ = *H. pallescens* β. *foliatum* Wimm.²⁾ — *pallidifolium* J. Knaf³⁾ zu nennen.

H. chlorocephalum wird jetzt allgemein als gute Art aufgefasst. Und wenn auch der Habitus bisweilen ziemlich stark an den einiger Formen von *H. vulgatum* Fries erinnert und sogar an den von *H. nigratum* Uechtr., *stygium* Uechtr., *Engleri* Uechtr. und *bohemicum* Fries anklingt, so ist doch ein näherer Zusammenhang aus folgenden Gründen nicht gut anzunehmen.

Die Aehnlichkeit des *H. chlorocephalum* mit *H. nigratum* ist nur eine rein äusserliche und fällt überhaupt nur an manchen Individuen auf; engere Beziehungen können tatsächlich nicht vorhanden sein, weil *H. nigratum* nur im Osten, *H. chlorocephalum* aber auch mehrfach im Westen des Riesengebirges vorkommt. Eine Beziehung zu *H. stygium* ist deshalb ausgeschlossen, weil dieses *Hieracium* im Riesengebirge fehlt, und zu *H. bohemicum* deshalb, weil dieses im Gesenke nicht vorkommt. Mit *H. Engleri* darf man *chlorocephalum* nicht in Verbindung bringen, weil *H. Engleri* ungleich seltener als *chlorocephalum* ist und dieses im Riesengebirge an vielen Stellen wächst, wo *H. Engleri* fehlt. *H. vulgatum* hat zuweilen ziemlich grosse habituelle Aehnlichkeit mit *H. chlorocephalum*, obwohl es mit ihm wegen der Kopfgrösse und der breiten Berandung der Hüllschuppen nicht zu verwechseln ist; auch die Standorte erlauben die Annahme eines Zusammenhanges mit *H. vulgatum*, aber es fehlt eben die andere Sippe, die mit diesem zusammen das *H. chlorocephalum* hervorgebracht haben könnte. H. Schmidtii Tsch., das blaugrüne Blattfarbe und breitberandete Kopfschuppen

¹⁾ Wimmer, in 22. Jahresb. schles. Gesellsch. f. vaterl. Kult., 1845, p. 60; vergl. Uechtritz in Ö. B. Z. XXII, 1872 p. 311.

²⁾ Flora von Schlesien, 1857, p. 309.

³⁾ Ö. B. Z. XXII., 1872, p. 77/78.

hat, kann wegen seiner andern Eigenschaften und wegen des Fehlens im grossen Kessel des Giesenskes nicht in Betracht kommen. Zur Annahme von Variation oder Mutation aus *H. vulgatum* für die Entstehung des *H. chlorocephalum* ist man nicht ohne weiteres berechtigt, weil die Abweichungen im ganzen meist zu gross sind. Mutation ist zwar denkbar, aber nicht nachweisbar und zudem unwahrscheinlich, weil die grosse Verbreitung des *H. vulgatum* zu der geringen des *H. chlorocephalum* in keinem Verhältnis steht.

Rein habituell kann *H. chlorocephalum* am ehesten als Zwischensippe von *H. bohemicum* und *vulgatum* aufgefasst werden, was auch Uechtritz schon andeutete¹⁾.

Aus den angeführten Tatsachen geht hervor, dass die Versuche, die Verwandtschaft näher zu ergründen, nur durch unzulängliches Beweismaterial gestützt sind; und so tut man am besten, wenn man in *H. chlorocephalum* eine ziemlich isoliert dastehende Hauptart anerkennt. Soviel steht jedenfalls sicher, dass die konstanten Merkmale, die unsere Art leicht kenntlich machen, das Resultat einer besonders auffälligen Entwicklung sind, welche, auf Hybridität begründet, zu einer Form geführt hat, die man als zur guten Art gewordene Sippe betrachten muss.

b) Die Zwischenformen.

Wenn man einerseits von *H. chlorocephalum* absieht, weil diese Hauptart eine isolierte Stellung einnimmt, und anderseits *H. tubulosum* mit *H. alpinum* als Einheit aufasst, so kann man sich die 5 Hauptarten *H. alpinum-tubulosum*, *preanthoides*, *murorum*, *vulgatum* und *caesium* so gestellt denken, dass sie die Ecken eines Polyeders einnehmen. Dessen Kanten und Flächen werden dann von den Zwischenformen besetzt. Jede Hauptart macht nun einen bestimmten Einfluss geltend, der die Stellung der Zwischenformen bestimmt.

¹⁾ Ö. B. Z. XXII, 1872, p. 311.

Die Hauptmerkmale sind für den Einfluss von

1) *H. alpinum-tubulosum*: Die bedeutende Grösse der Köpfe, die Einzahl der Köpfe, die Stärke der Borstenhaarbekleidung im Gegensatz zu der geringen Kopfgrösse, der Mehr- oder Vielzahl der Köpfe, der vorwiegenden Drüsenhaarbekleidung der andern Hauptarten.

2) *H. prenanthoides*: Die stengelumfassende Gestalt der Blätter, das Fehlen der Grundblätter zur Blütezeit im Gegensatz zu der nicht umfassenden Blattgestalt und dem Vorhandensein der Grundblätter bei den andern Hauptarten.

3) *H. murorum*: Die gewöhnliche Breite der Grundblätter und, wenn vorhanden, der Stengelblätter im Gegensatz zur Schmalheit der Blätter der andern Hauptarten. Dazu kommt, dass die Blätter zu einer grundständigen Rosette angeordnet sind, während der Stengel wenigblättrig oder blattlos ist, und dass der Köpfchenstand rispig-ebensträussig wird.

4) *H. vulgatum*: Die im allgemeinen schmale und zugleich scharf spitzige Gestalt der Stengelblätter im Gegensatz zu deren stumpfspitziger Gestalt der andern schmalblättrigen Hauptarten.

5) *H. caesium*: Vor allem die völlige Drüsenlosigkeit im Gegensatz zur Reich- oder Armdrüsigkeit der andern Hauptarten. Die übrigen Eigenschaften von *H. caesium* erinnern an die *H. von vulgatum* und *murorum*.

Wesentlich für die Erkennung der Zusammengehörigkeit sind natürlich auch der Habitus und besonders die Standortverhältnisse. Die Blütezeit dagegen kann kaum sichere Schlüsse auf die Möglichkeit der Bastardnatur von Zwischenformen gestatten, denn sie lässt in allen Fällen die Möglichkeit der Bastardierung zu. Die Arten blühen sämtlich im Juli und August, und wenngleich sich kleine Unterschiede in der früheren oder späteren Entwicklung der Blüten geltend machen, wie z. B. zwischen *H. alpinum* und *H. prenanthoides*, so wird der sorgsame Beobachter doch zweifellos im Gebirge Stellen finden, an denen selbst gegen Ende August das typisch früher blühende *H. alpinum* und das spät blühende *H. prenanthoides* gleichzeitig ihre Köpfe endfalten.

2) **Zu guten Arten gewordene Bastarde oder Mutationen.**

1. *Hieracium bohemicum* Fries ist eine Sippe, die trotz des oft sehr unheilvollen Prioritätsprinzips, wonach sie *H. sudeticum* Stbg.¹⁾ heissen müsste, besser unter der Bezeichnung *H. bohemicum* Fries²⁾ geht, weil dadurch Verwechselungen mit *H. pedunculare* Tsch. vermieden werden. Weitere Synonyma: *H. pulmonarioides* Presl³⁾, *H. cydoniaefolium* Tsch.⁴⁾ *H. carpathicum* Grieseb.⁵⁾

H. bohemicum zeigt zu *H. prenanthoides* offenbare Beziehungen, die aber auch andererseits auf *H. polymorphum* G. Schud., einer später zu besprechenden Sippe, hindeuten. Die Verwandtschaft mit *H. prenanthoides* spricht sich in folgendem aus: Mehrblättriger Stengel mit wohlausgebildeten, halbstengelumfassenden Blättern: meist Mehrheit der Köpfchen.

Die Beziehung zu *H. polymorphum* ist in folgendem zu erkennen: Ein oder einige Grundblätter bleiben zuweilen bis zur Blütezeit erhalten; geringere Zahl der Stengelblätter als bei *H. prenanthoides*; geringere Zahl der Köpfchen als bei *H. prenanthoides*, manchmal nur ein-, gewöhnlich 3–4-, selten vielköpfig; Seitenäste schon tiefer unten beginnend als bei *H. prenanthoides*, daher nicht so dichte Kopfstände. Grösse der Köpfe, die an normalen Individuen stets die der *Prenanthoides*köpfe übertrifft.

Die Verwandtschaft des *H. bohemicum* mit *prenanthoides* kann wohl kaum angezweifelt werden. Da nun *H. bohemicum* eine sehr verbreitete Art ist, so darf man mit ihm nur ebenfalls verbreitete Typen in Beziehung setzen. Ausser *H. polymorphum* und *prenanthoides* sind wohl die verbreitetsten *H. alpinum*, *murorum* und *vulgatum*. Eine Ver-

¹⁾ in Denkschriften der bairischen botanischen Gesellschaft zu Regensburg, 1818, p. 62.

²⁾ Fries, *Epicrisis Generis Hieraciorum* in Upsala Universitets Arsskrift, 1862, p. 47/48.

³⁾ in *Flora Čechica*, 1819, p. 159.

⁴⁾ *Flora*, XI. Jg. 1828., 1. Ergänzungsblätter p. 75.

⁵⁾ Abhandlungen der Königl. Gesellsch. der Wissenschaften zu Göttingen, V. Band, 1853, p. 114.

wandtschaft mit den beiden letzteren würde vor allem die Grösse der Köpfe des *H. bohemicum* nicht erklären können. Eine Verwandtschaft mit *H. alpinum* ist insofern vorhanden, als *H. polymorphum* jenem sehr nahe steht. Sonach kann für unsere Sippe eine hybride Entstehung aus *H. polymorphum* und *prenanthoides* angenommen werden; und zwar neigt *H. bohemicum* im Allgemeinen mehr dem *H. prenanthoides* zu.

Die grosse Verbreitung des *H. bohemicum* im Riesengebirge erfordert nun die Annahme, entweder, dass *H. bohemicum* alljährlich neu durch Bastardbildung entstehe, oder dass es eine schon sehr alte Form darstelle. Die letztere Ansicht ist entschieden vorzuziehen; denn einmal wurde nie die Entstehung des *H. bohemicum* unmittelbar beobachtet, das andre Mal bliebe es unverständlich, weshalb man *H. bohemicum* sehr oft an Stellen findet, wo kein *H. prenanthoides* in unmittelbarer Nähe wächst. Als eigentliches Entstehungsgebiet muss man natürlich die Standorte betrachten, in denen die Verbreitung von *H. prenanthoides* und *polymorphum* zusammenstösst, also die Knieholzregion; und in der That sind auch diese Striche der Hauptstandort für *H. bohemicum* (z. B. Lehen über den Teichen, Melzergrund, langer Grund u. s. f.).

Die Ansicht über die Hybridität des *H. bohemicum* zwischen *H. polymorphum* und *prenanthoides* vertritt auch G. Schneider¹⁾.

Es gibt zwar Formen mit breiteren und schmälere Blättern, aber solche dürfen keineswegs den Anspruch auf irgend welche Selbständigkeit erheben. Auch Schneider kennt diese Formen, ohne ihnen Namen beizulegen. Im allgemeinen zeichnet sich *H. bohemicum* durch grosse Konstanz der Merkmale und ausser der erwähnten Blattbreite und der wechselnden Zahl der Köpfe durch kaum vorhandene Variabilität aus. Und gerade deshalb erscheint es durchaus berechtigt, diese Sippen als gute Art anzuerkennen.

¹⁾ R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 65.

2. *Hieracium pedunculare* Tsch.¹⁾ = *H. sudeticum* Stbg. ex p.²⁾ — *H. macrostylum* Tsch.³⁾ = *H. alpinum* 4. *sudeticum* 5. *glossophyllum* W. Gr.⁴⁾ ist eine Sippe, die den Uebergang von *H. bohemicum* Fries zu *H. polymorphum* G. Sehd. vermittelt. Wimmer zieht diese Pflanze in seiner letzten Flora zu *H. sudeticum* Stbg. und hält sie, mit *H. bohemicum* Fries zusammengefasst, für eine aus *H. alpinum* und *carpathicum* Bess. entstandene, nicht eigenberechtigte Art⁵⁾. Uechtritz dagegen erkennt in ihr eine Sippe an, die „bereits den Wert einer eigenen Art beanspruchen“ darf, und fasst sie als Bastard zwischen *H. alpinum* (mit *foliosum* Tsch.!) und *bohemicum* Fries auf⁶⁾. Diese letzte Ansicht ist durchaus anzuerkennen und stimmt auch mit der von Schneider überein⁷⁾. Schube der auf die Entstehung nicht eingeht, erkennt jedenfalls *H. pedunculare* als gute Art an⁸⁾.

Auf *H. bohemicum* deutet die Form der Blätter, auf *H. polymorphum* die Art der Verzweigung, die oft schon im unteren Teile des Stengels beginnt, ferner die Grösse der Köpfe, welche die von *H. bohemicum* merklich übertrifft, mit ihr die Art der Kopfhüllen, die schon lockerer zu werden beginnen, und die Behaarung, die stärker borstig als bei *H. bohemicum* ist und sich der von *H. polymorphum* am meisten nähert. Die Zahl der Stengelblätter kann hier kein Charakteristikum abgeben, da *H. bohemicum* mehrblättrig ist und ebenso *H. polymorphum*.

Es erübrigt sich noch, eine Form, die dem typischen *H. pedunculare* oft sehr ähnlich sieht, zu besprechen, die

¹⁾ Flora XI. Jg. 1828, 1. Ergänzungsblätter, p. 76.

²⁾ Denkschriften der bairischen bot. Gesellsch. zu Regensburg, 1818, p. 62.

³⁾ Flora XX. Jg. 1837, Beiblätter I. p. 69.

⁴⁾ Flora Silesiae III, 1829, p. 182.

⁵⁾ Flora von Schlesien, 1857, p. 308.

⁶⁾ Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 269/70.

⁷⁾ Ö. B. Z. XXXVII, 1887, p. 351 u. R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 65.

⁸⁾ Schube, Flora von Schlesien, 1904, p. 417.

var. *plejocephalum* Uechtr.¹⁾. In der von Uechtritz gewählten Umgrenzung — Uechtritz ist sich selbst noch nicht klar, denn er empfiehlt die Form weiterer Beobachtung — stellt diese Form, wie aus dem Material des Breslauer Herbariums hervorgeht, keine einheitliche Sippe dar, denn es gehören dazu einmal Varietäten des *H. polymorphum*, das andere Mal aber umfasst diese Pflanze auch Varietäten des *H. pedunculare*, die sich von dessen typischer Form nur durch die schwächere Ausbildung unterscheiden.

Individuen dieser letzten Ausbildung sind verhältnismässig selten und kommen sowohl im Westen wie im Osten des Riesengebirges vor. Das typische *H. pedunculare* ist auch über grössere Strecken verbreitet, doch so, dass es im Westen bei weitem überwiegt, während die schwächere Form (*plejocephalum* Uechtr. ex p.) trotz ihrer Seltenheit überall in gleicher Verbreitung auftritt und sich wohl auf dem Koppenplane nur noch allein findet. An der Rennerbaude habe ich sie selbst gesammelt. Die am weitesten nach Osten vorgeschobenen sicheren Vorkommnisse des typischen *H. pedunculare* dürften wohl den Abhängen des Ziegenrückens und dem langen Grunde angehören. Aber es werden auch Standorte aus dem Melzergrund²⁾, ferner vom kleinen Teiche (Wimmer) und vom Brunnenberge (Freyn) angegeben. Die Identität dieser Formen mit *H. pedunculare* wurde wohl angezweifelt, aber sie sind wahrscheinlich nichts anderes als die hier in Betracht kommenden kleinere Form des *H. pedunculare*. Für die von Freyn auf dem Brunnenberge gesammelten Individuen ist es sogar sicher, denn Belegexemplare liegen im Herbarium des Breslauer botanischen Gartens.

Ich halte also die in Frage stehende Form für nichts anderes als ein schwach ausgebildetes *H. pedunculare*. Das typische *H. pedunculare* ist eine ziemlich kräftige Pflanze;

¹⁾ Fieck, Flora von Schlesien, 1881, p. 267.

²⁾ G. Schneider in R. W. B. XII, 1892, 1 u. 2 p. 24: „Möglicherweise nicht hierher gehörige Formen“.

sie bevorzugt besseren Untergrund und hat vielleicht an derartigen Stellen (Elbe-, Panschewiesen) die geeignetsten Verhältnisse für ihr Gedeihen gefunden. Das *H. plejocephalum* findet sich nun meist an Stellen mit sterilerem Boden, und es ist daher anzunehmen, dass dessen Einwirkung zu der schwächeren Ausbildung beiträgt. Am wichtigsten aber ist eine Beobachtung, die ich im Sommer 1904 zu machen Gelegenheit hatte. Jener Sommer zeichnete sich bekanntlich durch auffallende Trockenheit aus, und in der Tat stellte es sich heraus, dass trotz angestrengten Suchens nicht ein typisches *H. pedunculare* gefunden wurde, sondern dass alle auf der Elbe-, Panschewiese und dem Krkonoš stehenden, hier in Betracht kommenden Hieracien dem *plejocephalum* angehörten. Daraus geht doch sehr deutlich hervor, dass wir es in „*H. plejocephalum*“ mit einer schwächeren Ausbildung des *H. pedunculare* zu tun haben.

Bezüglich der Variabilität des *H. pedunculare* gilt folgendes. Nach dem Maximum der Entwicklung zu haben wir Formen, die überaus kräftig sind¹⁾ und durch ihren robusten Habitus einige Abweichungen hervorbringen. Diese letzteren bestehen lediglich darin, dass die Individuen vielblättrig werden, dass ferner die Blätter sich kaum noch in der Gestalt der typischen Form zeigen, indem sie sich langsam verschmälern und so fast einen kurzen, nicht mehr halbstengelumfassenden Stiel erhalten, dass die Blätter meist sehr stark gezähnt sind und weniger vom Stengel abstehen, als bei den übrigen zwei jetzt zu besprechenden Formen. Ausserdem erreichen wegen der allgemeinen robusten Entwicklung auch hier die Köpfe ihr Grösseximum für *H. pedunculare*.

Das typische *H. pedunculare* besitzt auch gezähnte Blätter, aber nicht in dem Masse; die Blätter sind am Grunde ziemlich plötzlich verschmälert und schwach halb-

¹⁾ Ein Individuum des Breslauer Herbarium: 48 cm hoch, Stengeldurchmesser am Grunde 0,6 cm, unter dem Hauptkopfe 0,25 cm, 9 erhaltene Stengelblätter, ihrer 3 schon vertrocknet.

umfassend, die ganze Pflanze ist schwächer, obwohl immer noch kräftig zu nennen, die Köpfe sind dementsprechend etwas kleiner als bei dem robusten Extrem.

Das Minimum der Entwicklungsreihe ist das oben genannte *H. plejocephalum*. Hier sind die Blätter ziemlich deutlich halbstengelumfassend, meist kommt ein Stengelblatt weniger als bei der vorigen Form zu guter Entwicklung, die Blätter sind fast gar nicht oder nur sehr schwach gezähnt, eine Verzweigung kommt nur noch selten vor, die Individuen sind also grösstenteils einköpfig. Die Köpfe selbst sind fast eben so gross wie die der typischen Form oder nur um ein geringes kleiner.

Dieser Einblick in die Kontinuität der Formen kann in hohem Grade dazu beitragen, sie als gleichen Ursprunges anzuerkennen.

3. *Hieracium polymorphum* G. Schnd.¹⁾ = *H. alpinum foliosum* Tsch.²⁾ = *H. Fritzei*, F. Schultz ex p.³⁾ = *H. montanum* G. Schnd.⁴⁾. Der ältere von Tausch 1828 gegebene und von Wimmer angenommene Name ist seit Waldstein und Kitaibel schon für ein ganz anderes *Hieracium* in Gebrauch⁵⁾ und der Name *Fritzei*, F. Schultz trifft nur teilweise auf die hier zu besprechende Sippe zu.

Die verschiedenen Varietäten dieser Sippe, die Schneider unterscheidet, nämlich var. α) *Fritzei* F. Schultz, β) *pseudopersonatum* G. Schnd., γ) *spathulifolium* G. Schnd., δ) *Uechtritizianum* G. Schnd., ergeben zwar in ihrer Gesamtheit das richtige Bild der Art, ihre Unterscheidung führt aber zu keinem recht befriedigenden Resultate. In der tabellari-schen Zusammenstellung Schneiders⁶⁾ steckt eine grosse Menge gewissenhafter Arbeit, aber es ist eben nicht möglich,

¹⁾ R. W. B. XI, 1891, 3 u. 4 p. 23.

²⁾ Flora, XI. Jahrg., 1828, 1. Ergänzungsblätter p. 63.

³⁾ Flora, Neue Reihe XXX. Jahrg. 1872, p. 281.

⁴⁾ Ö. B. Z., XXXVI. Jahrg., 1886, p. 22.

⁵⁾ Waldstein und Kitaibel, Descriptiones et icones plantarum rariorum Hungariae, Vol. II, 1805, tab. 145.

⁶⁾ R. W. B. XI, 1891, 3 u. 4 p. 24.

alle Einzelheiten auseinander zu halten, einfach, weil ihrer zu viele und sie gar nicht scharf geschieden, sondern durch mannigfaltige Uebergänge verbunden sind.

Der Habitus ist es, welcher der Pflanze ihren Typus wesentlich mit aufprägt. Richtet man sich hiernach, so lassen sich zwei Varietäten unterscheiden, die eine, welche steif, die andere, welche, obwohl auch meist ziemlich gerade aufrecht, schlank, fast zierlich gebaut ist. Jede dieser Varietäten schliesst in sich besondere Ausbildungsformen, die erstere solche mit ein- und mehrköpfigen Stengeln, die letztere solche mit schwachem und sehr starkem Wachstum. Aber bei der ersten Varietät macht die Vielköpfigkeit gegen die Einköpfigkeit mancher Individuen keinen wesentlichen habituellen Unterschied aus; das typische, das bei dieser Varietät auffällt, bleibt für beide Unterformen das gleiche, nämlich das steife Wachstum. Und bei der schlanken Varietät wird dadurch, dass zuweilen sehr kräftige Individuen zur Ausbildung gelangen, doch in keinem Falle das eigentlich typische, die Schlankheit beeinträchtigt.

Hier und da finden sich auch Formen, die zwischen beiden Varietäten die Mitte halten. Das für beide Varietäten Gemeinsame ist in der von Schneider gegebenen Diagnose¹⁾ enthalten und bedarf keines weiteren Zusatzes.

Die steife Form nenne ich var. Fritzei F. Schultz. Der steife Stengel ist (15 –) 18—25 —30) cm hoch, entweder meist verzweigt oder seltener einköpfig. Die Seitenzweige entspringen aus einer Blatt- oder Bracteenachsel und laufen entweder dem Hauptstengel parallel, sodass sie sogar öfter, besonders die oberen, ein Stück lang mit demselben verwachsen, oder sie stehen etwas weiter ab und sind dann bald steif, bald führen sie charakteristische Biegungen aus, die aber die Steifheit der ganzen Pflanze nicht zu beein-

¹⁾ R. W. B. XI, 1891, 3 u. 4 p. 23.

trächtigen vermögen. Die Pflanze macht im allgemeinen einen ziemlich kräftigen Eindruck. Die Köpfe haben in den weitaus meisten Fällen stylöse Blüten.

Diese Varietät findet sich sehr oft in ein- oder mehrköpfigen Individuen dicht zusammenstehend, aus einem Stocke entspringend. Ihr Verbreitungsgebiet ist die ganze Knieholzregion bis hinauf zum Brunnenberge und in die Nähe des Schneekoppengipfels; sie erscheint besonders gern in nächster Nähe der Knieholzbüsche.

Die schlanke Form nenne ich var. *Uechtritzianum* G. Schnd. Diese Varietät ist in schwachen und sehr kräftigen Individuen entwickelt. Danach variiert ihre Grösse von etwa 8—15 cm Höhe der kleinsten Formen, die übrigens meist stylös sind, über etwa 20 cm Höhe der gewöhnlichen bis zu 30 cm Höhe der robusten Form. Der schlanke, aber wie bei voriger Varietät meist ziemlich gerade aufrechte Stengel ist fast immer einköpfig, doch kann auch einmal Verzweigung eintreten. In dem reichen mir zur Verfügung stehenden Material findet sich nur ein einziges zweiköpfiges Individuum. Der Stengel ist bei den schwächeren Formen dünn zu nennen, bei den stärkeren kräftig. Die Blätter, besonders bei der robusten Form, werden zuweilen halbstengelumfassend.

Das Verbreitungsgebiet dieser Varietät ist das gleiche wie das der var. *Fritzei*, doch liebt sie besonders offene Wiesenflächen, wie z. B. den Koppenplan, wo sie in reicher Menge in zungenblütigen und stylösen Individuen anzutreffen ist. Bei weitem überwiegend ist die schwache Ausbildungsform, die starke ist sehr selten. Schneider fand sie besonders am Oberrande des Aupagrundes, meist mit zungenblütigen Köpfchen.

Der Name *Fritzei* wurde hier für die Gesamtheit der steifen Formen gebraucht. Die Originaldiagnose von H. *Fritzei*¹⁾ passt vielleicht am besten auf diese, während sie auf das ganze H. *polymorphum* nicht vollständig zutrifft. Die zweite Varietät wurde mit dem Namen *Uechtritzianum*

¹⁾ Flora, Neue Reihe, XXX. Jahrg. 1872, p. 281.

belegt, obwohl dieser Name dem Schneiderschen Sinne nicht ganz entspricht.

Nach diesen Auseinandersetzungen fragt es sich, welche phylogenetische Stellung dem *H. polymorphum* zukommt. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, dass die Sippe verwandtschaftliche Beziehungen zu *H. alpinum* und *tubulosum* hat; alle Forscher sind sich darin einig. Aber trotz dieser Verwandtschaft hat man das Recht, *H. polymorphum* als scharf umgrenzte Form zu bezeichnen, weil es von den andern nahe stehenden Sippen leicht zu unterscheiden und überdies sehr häufig ist. Auch Schneider ist dieser Ansicht, nachdem Pax sie zum ersten Male betont hatte¹⁾.

H. polymorphum kommt seinem Habitus nach in der var. Fritzei dem bereits besprochenen *H. tubulosum* am nächsten, ist aber von diesem unter anderem vor allem wegen des Mangels der tubulösen Blüten nicht zu verwechseln; und liegt einmal ein stylöses *H. tubulosum* vor, so sind dessen Köpfe meist grösser und ihre Involucralblätter lockerer, ausserdem ist *H. tubulosum* fast stets einköpfig. Die var. Uechtritzianum erinnert trotz ihrer Stengelblätter mehr an *H. alpinum* selbst, wie auch diese Varietät gerade unter dem typischen *H. alpinum* viel zu finden ist, während die var. Fritzei besonders gern mit *H. tubulosum* vergesellschaftet auftritt.

Mit *H. pedunculare* ist eine Verwandtschaft nicht denkbar. *H. polymorphum* kann zwar nach seiner Gestalt als Mittelform zwischen *H. alpinum* und *pedunculare* gelten, aber in anbeacht der Standortsverhältnisse erscheint es ausgeschlossen, *H. polymorphum* als Bastard zwischen beiden deuten zu wollen, denn *H. polymorphum* kommt in der hohen Tatra vor, wo *H. pedunculare* fehlt, und auch im Riesengebirge ist *H. polymorphum* ungleich häufiger als *H. pedunculare*.

Man geht vielleicht am richtigsten, wenn man in *H. polymorphum* eine Mutation erblickt, an deren Bildung sich

¹⁾ F. Pax; Flora des Rehhorns bei Schatzlar, 1883 p. 44.

sowohl *H. alpinum*, als auch *tubulosum*¹⁾ beteiligt haben. In der var. *Fritzei* wiegt der Einfluss von *H. tubulosum*, in der var. *Uechtritzianum* der von *H. alpinum* vor. Die zuweilen vorkommenden Uebergänge und die gemeinschaftlichen Berührungspunkte verbinden beide Varietäten zu einem in sich geschlossenen Verwandtschaftskreise.

4. *Hieracium atratum* Fries²⁾ = *H. alpinum* 5. *nigrescens* W.Gr.³⁾ = *H. nigrescens* β . *multiflorum* Wimm.⁴⁾ ist eine Sippe, die in ihrer Ausbildung zwischen *H. alpinum* und *murorum* steht. Sie ist polymorph; zu ihr gehört eine ganze Reihe von Formen, die mit einander durch Uebergänge sehr eng verbunden sind; nach der einen Seite hin schliessen sich die Formen an *H. murorum* an, nach der andern an *H. nigrescens* Willd., einer später zu besprechenden Sippe, welche sich zwischen *H. atratum* und *alpinum* einschiebt.

Für die Verwandtschaft des *H. atratum* mit *murorum* sprechen: Die Gestalt und typische Bezeichnung der Grundblätter und, wenn vorhanden, auch der Stengelblätter, die Mehrköpfigkeit, die über die seltene Einköpfigkeit bedeutend überwiegt, die Drüsenhaarbekleidung.

Für die Verwandtschaft des *H. atratum* mit *H. alpinum* spricht vor allem die Grösse der Köpfe, die bei normalen Individuen stets auffallend grösser als bei *H. murorum* ist.

Es lässt sich hier eine Analogie zu dem als Bastard zwischen *H. prenanthoides* und *polymorphum* aufgefassten *H. bohemicum* erkennen, das gleichfalls grössere Köpfe aufweist. Auch der Habitus des *H. atratum* erinnert weit mehr an den von *H. murorum*, wie *H. bohemicum* mehr an *H. prenanthoides* anklängt. Man darf deshalb, zumal da wegen

¹⁾ In der Tatra, wo heut *H. tubulosum* fehlt, können zur Zeit der Entstehung des *H. polymorphum* noch Individuen des *H. alpinum* mit den ursprünglichen tubulösen Blüten vorhanden gewesen sein. Solche Individuen sind nach dem Gesagten etwa gleichwertig mit *H. tubulosum*.

²⁾ *Symbolae Hieraciorum*, p. 105.

³⁾ Wimmer et Grabowski, *Flora Silesiae* III, 1829 p. 182.

⁴⁾ Wimmer, *Flora von Schlesien*, 1857, p. 310.

der Verbreitung keinerlei Schwierigkeiten erwachsen, das *H. atratum* als goneoklinen Bastard zwischen *H. murorum* und *alpinum* ansehen. Beide Elternarten sind häufige Hieracien; auch *H. atratum* ist nicht selten und hauptsächlich an Standorten anzutreffen, wo *H. murorum* und *alpinum* zusammenstossen, also in der Knieholzregion. Es finden sich aber auch öfter Individuen an hochgelegenen, offenen Stellen, wo *H. murorum* weit seltener oder garnicht mehr wächst. Das spricht dafür, dass in *H. atratum* eine alte Sippe erblickt werden muss.

Es wurde bereits erwähnt, dass *H. atratum* eine vielgestaltige Art ist. Betrachtet man die Gesamtheit ihrer Formen, so erkennt man zwei Extreme, die mit einander durch eine Fülle von Uebergangsstufen verbunden sind. Es ist nicht ausgeblieben, dass einige Formen Namen erhielten. So wurden die im allgemeinen dem *H. murorum* näher stehenden Formen, falls sie sich durch besondere Vielköpfigkeit, somit auch kraftvolle Entwicklung auszeichnen, als eigne Art unter dem Namen *H. polycephalum* von Velenovsky abgetrennt; und die dem *H. nigrescens* im allgemeinen nahe kommenden Formen vereinigte Fries zu der Varietät *subnigrescens*.

Uechtritz erwähnt in Fiecks Flora¹⁾ nur diese letztere, Schube führt diese als Unterform, jene als Varietät an²⁾. G. Schneider aber, der richtig erkennt, dass mit den beiden Bezeichnungen wenig gewonnen ist, sagt in seiner Monographie³⁾, dass er „ihnen die Qualitäten von Varietäten nicht zuerkennt“. Diesem Urtheil wird hier beigepflichtet. Wenn nun die einzelnen Formen des *H. atratum* wegen der vielen Uebergänge nur schwer oder gar nicht sicher auseinanderzuhalten sind, so ist es auch zwecklos, die gegebenen Namen beizubehalten. Bei dem vorher besprochenen *H. polymorphum* lagen die Verhältnisse anders. Dort

¹⁾ Fieck, Flora von Schlesien, 1881, p. 275.

²⁾ Schube, Flora von Schlesien, 1904, p. 420.

³⁾ R. W. B. XIII, 1893, 3 u. 4. p. 25.

konnten Varietäten unterschieden werden, die ein habituelles Merkmal doch immerhin ziemlich deutlich auseinanderhalten liess. Auch hier sind es habituelle Merkmale, die wohl in erster Linie zur Aufstellung der Varietäten Veranlassung gegeben haben, aber sie sind eben nicht deutlich, sind durch die allzu mannigfaltigen Uebergänge verwischt. Wir lassen daher die erwähnten Varietäten oder Unterformen fallen und gewinnen somit ein einheitliches *H. atratum*, das nach zwei Richtungen hin variiert. Wenn wir dennoch die Vielgestaltigkeit des *H. atratum* als zu weitgehend betrachten, um einen einzigen Namen in Anwendung zu bringen, so ist am ehesten noch die var. *polycephalum* Velen. abzuzweigen.

Die Merkmale, welche alle Ausbildungsformen des *H. atratum* verbinden, sind die dunkle Farbe der Hüllschuppen und die Grösse der Köpfe, ferner die Behaarung und einige aus den Diagnosen ersichtliche, unwesentlichere Eigenschaften.

Die beiden ersten Merkmale zugleich können zur Unterscheidung des *H. atratum* von *H. murorum* dienen. Die Farbe der Hüllschuppen unterscheidet das *H. atratum* aber nicht gegen *H. nigrescens*; hier ist die bedeutende Grösse der Köpfe von *H. nigrescens* das Hauptunterscheidungsmerkmal, ebenso dessen mehr zottiges Indument.

H. atratum darf als „gute Art“ aufgefasst werden, trotz seiner Variabilität. Dafür spricht besonders seine grosse Verbreitung im Riesengebirge. Wimmer und Grabowski stellen *H. atratum* noch als Varietät zu *H. alpinum*, doch Wimmer selbst zieht es später zu *H. nigrescens* Willd.. Damit kommt er der Wahrheit schon näher, doch müsste *H. nigrescens* um seiner grösseren Seltenheit willen dann richtiger zu *H. atratum* gestellt werden. Uechtritz hält *H. atratum* für eine Mittelart von *H. alpinum* und *murorum*¹⁾, die hier geäusserten Ansichten stimmen also damit überein. Auch ist er sowohl wie G. Schneider der Ansicht, dass *H. atratum* das Recht einer „guten Art“ erworben habe.

¹⁾ Fick, Flora von Schlesien, 1881, p. 275.

5. *Hieracium nigritum* Vechtr.¹⁾ = *H. amplexicaule* Tsch.²⁾ = *H. nigrescens* b. *pulmonarium* W. Gr.³⁾ = *H. nigrescens* β . *multiflorum* Wimm. ex. p.⁴⁾ = *H. epimedium* Celak.⁵⁾ zeigt sehr grosse Aehnlichkeit mit *H. atratum*, und zwar besonders mit dessen mehrköpfigen, stengelblättrigen Formen. Es finden sich sogar zuweilen Individuen von *H. nigritum*, die man fast mit gleichem Rechte dem *H. atratum* zurechnen darf. Andererseits aber hat *H. nigritum* beinahe durchweg etwas halbstengelumfassende Blätter, und man könnte geneigt sein, diese Eigenschaft dem Einflusse einer der mit *H. prenanthoides* verwandten Sippen oder des *H. prenanthoides* selbst zuzuschreiben, also für *H. nigritum* hybride Entstehung zwischen einem dieser Hieracien und *H. atratum* anzunehmen. Aber eine Ableitung von *H. rhiphaeum*, *bohemicum*, *pedunculare*, *pseudalbum*, *album*, *Wimmeri*, *corconticum* und *asperulum* ist von vorn herein ausgeschlossen, weil alle diese Sippen im Gesenke fehlen. Aehnlich verhält es sich mit *H. Engleri*. Und ein Zusammenwirken des *H. prenanthoides* und *atratum* bei der Bildung des *H. nigritum* hat deshalb wenig Wahrscheinlichkeit, weil *H. nigritum* im Gesenke sehr verbreitet ist, während *H. atratum* bisher nur an den Köperniksteinen gefunden sein soll.

Durch die verwandten Hieracien *nigrescens* und *murorum* lässt sich *H. atratum* nicht ersetzen, weil das erstere im Gesenke fehlt, das letztere mit *H. prenanthoides* aus morphologischen Gründen keinen Bastard vom Aussehen des *H. nigritum* bilden kann.

In *H. nigritum* eine Sippe *H. polymorphum-murorum* zu erblicken, wie das Zahn⁶⁾ tut, ist morphologisch durch-

¹⁾ in 50. u. 53. Jahresbericht der schles. Gesellsch. f. vaterl. Cultur p. 162 u. p. 144; Breslau, 1873 u. 1876.

²⁾ Flora, XI. Jg. 1828, 1. Erg. p. 76.

³⁾ W. Gr., Flora Silesiae III, 1829, p. 183.

⁴⁾ Wimm., Flora von Schlesien, 1857, p. 310.

⁵⁾ in 50. Jahresb. d. schles. Gesellsch. für vat. Cult., 1872, p. 162

⁶⁾ Zahn in Kochs Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora, 3. Aufl., p. 1889.

aus gerechtfertigt, da *H. polymorphum* zuweilen halbstengelumfassende Blätter hat, und auch insofern naheliegend, als man bei dieser Annahme Ausbildungsformen des *H. nigratum* unterscheiden kann, die bald dem *H. polymorphum*, bald dem *H. murorum* etwas näher stehen. Einer tatsächlichen Ableitung aber widersprechen die Standortsverhältnisse, denn *H. polymorphum* fehlt im Gesenke.

Man darf, da nach dem Gesagten eine hybride Entstehung des *H. nigratum* nicht denkbar, aber dessen Ähnlichkeit mit *H. atratum* nicht zu leugnen ist, für *H. nigratum* die Entstehung durch Variabilität oder Mutabilität aus *H. atratum* annehmen, indem eine auf *H. polymorphum* hindeutende Sippe erzeugt wurde.

Die zuweilen reichere Zottenbehaarung als bei *H. atratum*, die stets vorhandene Stengelbeblätterung und die etwas halbstengelumfassende Gestalt der Blätter des *H. nigratum* erinnern entschieden an *H. polymorphum*, alle andern Eigenschaften aber, wie vornehmlich die Form der Blattspreite, die Blattbezahnung, die Art der Verzweigung und die Grösse der Köpfe schliessen *H. nigratum* an *H. atratum* an. Die Annäherung des *H. nigratum* an *H. polymorphum* bedingt natürlich auch eine solche an *H. alpinum* und somit ist *H. nigratum* als Parallelsippe zu *H. decipiens* und *nigrescens*, deren Stellung später eingehender zu besprechen ist, aufzufassen. In dem hohlen Stengel muss eine besondere Eigentümlichkeit des *H. nigratum* erblickt werden.

Indem also *H. atratum* im Gesenke durch das ihm sehr nahe stehende *H. nigratum* fast ausschliesslich ersetzt wird, muss man in *H. nigratum* ebensogut eine zur guten Art gewordene Sippe erblicken wie in *H. atratum*; wenigstens ist sie es für das Gesenke. Uechtritz¹⁾ und (f. Schneider²⁾) betrachten sie als solche, Schube³⁾ stellt ihre Vollgültigkeit in Frage. Dasselbe tut Čelakovsky⁴⁾, der geneigt

¹⁾ Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 270.

²⁾ R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4. p. 66.

³⁾ Schube, Flora von Schlesien, 1904, p. 418.

⁴⁾ Prodomus Florae Bohemicae, 1867, p. 789.

ist, *H. nigritum* mit *atratum* direkt zu einer Spezies zu vereinigen. Von seinem Standpunkte aus ist Čelakovsky natürlich im Rechte.

6. *Hieracium Wimmeri* Uechtr.¹⁾ = *H. pallescens* Fries ex p.²⁾ -- *H. anglicum* Wimm.³⁾ ist eine Sippe, die schon von Uechtritz⁴⁾ als gute Art angesprochen wurde: „*stirps insignis, cum nulla sudetica rite comparanda*“; und Wimmers Flora, Schneiders Monographie und Schubes Flora vertragen durch den Druck die gleiche Ansicht, der auch hier von mir beiepflichtet wird.

Am nächsten kommt *H. Wimmeri* den *H. pseudalbinum* Uechtr., *erythropodum* Uechtr. und *albinum* Fries, dagegen ist die Uebereinstimmung mit *H. vulgatum*, die Uechtritz in seiner Originaldiagnose, um Verwechselungen vorzubeugen, bespricht, im Einklange mit Uechtritz ziemlich gering, aber wohl verständlich, wenn man in Erwägung zieht, dass damals *H. erythropodum* noch nicht unterschieden worden war. Mit diesem ist bei oberflächlicher Betrachtung *H. Wimmeri* vielleicht zu verwechseln.

Da nun aus später zu besprechenden Gründen *H. albinum*, *pseudalbinum* und *erythropodum* den Rang von eigenen Arten nicht besitzen, *H. Wimmeri* aber als scharf umgrenzte Sippe erscheint, so müssen wir von jenen Sippen hier absehen.

Von anderweitigen Arten sind natürlich nur im Riesengebirge und in der hohen Tatra vorkommende Sippen in Betracht zu ziehen, weil sich *H. Wimmeri* in diesen beiden Gebirgen findet. Eine Beziehung zu *H. bohemicum*, *pedunculare*, *chlorocephalum* und *Engleri* ist daher von vornherein ausgeschlossen. Ebenso fällt eine solche zu *H. alpinum* und *polymorphum* fort; das lehrt der grosse morphologische Unterschied des *H. Wimmeri* gegen diese ohne weiteres.

¹⁾ in Ö. B. Z., XXII. Jg., 1872, p. 277/78.

²⁾ *Epicrisis generis Hieraciorum*, 1862, p. 94.

³⁾ Wimmer, Flora von Schlesien, 1857, p. 308.

⁴⁾ in Ö. B. Z., XXII. Jg., 1872, p. 277/78.

Demnach bleiben noch *Hieracium nigratum*, *atratum*, *vulgatum*, *murorum* und *prenanthoides* übrig.

Die wahrscheinlichste Verwandtschaftslinie ist durch die Reihe *H. murorum* — *Wimmeri* — *prenanthoides* gegeben. Die Anforderungen, die *H. murorum* und *prenanthoides* an eine Zwischenform stellen, stimmen mit den Eigenschaften des *H. Wimmeri* überein. Denn auf *H. murorum* lässt sich das gewöhnliche Vorhandensein der Grundblätter zur Blütezeit, ihre Breite, ihre oft grobe Zähnelung, die geringere Zahl der Stengelblätter und die Art der rispig-ebensträussigen Verzweigung des Köpfchenstandes beziehen; und auf *H. prenanthoides* vor allem die Tatsache, dass das erste, bei kräftigen Individuen auch noch das zweite Stengelblatt halb-umfassend ist, ausserdem die Flügelung der Grundblattstiele und die Gestalt der Grundblattspreite, die trotz ihrer Breite doch schmärer als meist bei *H. murorum* erscheint. Man ersieht hieraus, dass die für die Verwandtschaft mit *H. murorum* sprechenden Merkmale immerhin schwerer wiegen als die auf *H. prenanthoides* hinweisenden. Der Bastard ist also als *goneoklin* zu *H. murorum* zu bezeichnen.

Wir nehmen jetzt Stellung zu den andern auf Grund der Standortsverhältnisse möglichen Fällen. Unter allen Umständen muss eine Sippe mit $\pm$ stengelumfassenden Blättern als eine Elternart gefordert werden. Solche Arten sind nur *H. nigratum* und *prenanthoides*.

Die für *H. nigratum* in Betracht kommenden Möglichkeiten sind in den Reihen 1) *H. nigratum* — *Wimmeri* — *atratum* 2) *H. nigratum* — *Wimmeri* — *vulgatum*, 3) *H. nigratum* — *Wimmeri* — *murorum*, 4) *H. nigratum* — *Wimmeri* — *prenanthoides* gegeben. Die engeren Standortsverhältnisse machen diese Verbindungen sämtlich unwahrscheinlich, weil *H. nigratum* nur im Osten des Riesengebirges vorkommt, *H. Wimmeri* aber auch im Westen reichlich vorkommt. Ausserdem ist nicht denkbar: Reihe 1), weil dann *H. Wimmeri* grössere Köpfe haben müsste, Reihen 2) und 4), weil dann die für *H. Wimmeri* typische rispige Verzweigung unerklärt bliebe.

Die für *H. prenanthoides* in Betracht kommenden Fälle ausser den Reihen *H. prenanthoides* — *Wimmeri* — *murorum* und *H. prenanthoides* — *Wimmeri* — *nigritum* sind in den Reihen 1) *H. prenanthoides* — *Wimmeri* — *vulgatum* und 2) *H. prenanthoides* — *Wimmeri* — *atratum* gegeben. Reihe 1) könnte die breitliche Gestalt der *Wimmeri*-Blätter nur unzureichend erklären und ist durch den oben zu 2 und 4) gebrachten Grund unwahrscheinlich gemacht. Reihe 2) erklärt die rispige Verzweigung nur mangelhaft, denn auch die dem *H. murorum* sich nähernden Formen von *H. atratum* sind gewöhnlich etwas steifer verzweigt als *H. murorum*, ausserdem macht die geringe Grosse der *Wimmeri*-Köpfe eine Verwandtschaft nicht sehr wahrscheinlich. Immerhin sind hier Beziehungen am ehesten zu finden, und das muss ja der Fall sein, weil *H. murorum* und *atratum* nahe verwandt sind.

Zu den engeren Standortsverhältnissen passt die oben vorgetragene Anschauung über die Bastardnatur des *H. Wimmeri* (*H. murorum* $\times$ *prenanthoides*) vollständig. *H. Wimmeri* kommt im Riesengebirge dort vor, wo die Standorte der präsumptiven Stammeltern in einander übergreifen, also in der Knieholzregion. Im langen Grunde, wo *H. prenanthoides* bis in die Waldregion hinabsteigt und *H. murorum* reichlich wächst, fand ich auch in dieser tiefen Lage *H. Wimmeri*. Bevorzugt werden Kare und Hochtäler.

7. *Hieracium Lurkynèi* Čelak.¹⁾ ist ein bisher nur am kahlen Berge und an der Kesselkoppe gefundenes, äusserst seltenes *Hieracium*, das G. Schneider in seiner Monographie²⁾ als selbständige Sippe, Schube in seiner Flora³⁾ aber nur als Varietät von *H. Wimmeri* auffasst. Ich kann über dieses *Hieracium* kein eigenes Urteil aussprechen, weil ich es weder in Originalexemplaren gesehen habe, noch die Diagnose auf eines der von mir gesammelten oder im Breslauer Herbarium befindlichen *Hieracien* zutrifft.

¹⁾ in Resultate der Durchforschung Böhmens im Jahre 1884, p. 8.

²⁾ R. W. B. XIII, 1893, 1. u. 2. p. 20/21.

³⁾ p. 418.

β) **Noch nicht als gute Arten zu bewertende mutmassliche Bastarde**

1. *Hieracium albinum* Fries. In *H. Wimmeri* lag ein Bastard zwischen *H. prenanthoides* und *murorum* vor, der nach *H. murorum* hin goneoklin ist; die gleichen Eltern erzeugen einen zweiten Bastard, der nach *H. prenanthoides* hin goneoklin ist, nämlich *H. albinum* Fries¹⁾.

Für seine Verwandtschaft mit *H. murorum* sprechen: Die breitliche Gestalt der Grundblätter, deren Vorhandensein zur Blütezeit; der rispige Köpfchenstand, der aber meist nicht mehr so locker wie bei *H. murorum* erscheint.

Für die Verwandtschaft des *H. albinum* mit *prenanthoides* sprechen: Die Flügelung der Grundblattstiele; die geringere Zähnelung der Blätter als bei *H. murorum*; das Vorhandensein von meist 2—4 Stengelblättern; der Umstand, dass meist 2, bei stärkeren Individuen auch mehr Stengelblätter halbumfassend sind; das unterste Stengelblatt macht den Eindruck eines in die Höhe gerückten Grundblattes und besitzt meist deutlich geflügelten Blattstiel.

Hiernach erscheint die am Anfange geäusserte Ansicht vom morphologischen Standpunkte aus gerechtfertigt. Aber auch die Standortsverhältnisse widersprechen einer solchen Anschauung nicht. *H. albinum* ist eine ziemlich seltene Riesengebirgspflanze, und wir dürfen in ihm deshalb vielleicht einen noch jungen Bastard erblicken. *H. Wimmeri* ist ihr als Schwester natürlich nahe verwandt, aber dennoch deutlich von ihr zu unterscheiden. *H. Wimmeri* ist auch als weit verbreitetere jedenfalls auch die ältere Sippe und deshalb als gute Art bewertet worden.

Die hier vorgetragene Ansicht über die Bastardnatur des *H. albinum* stimmt mit der Čelakovsky'schen überein²⁾. Uechtritz hebt die Verwandtschaft des *H. albinum* mit *H. Wimmeri*³⁾ und *murorum*⁴⁾ hervor.

¹⁾ *Epicrisis Generis Hieraciorum*, 1862, p. 103/104.

²⁾ In Verhandlungen des botanischen Vereins für die Provinz Brandenburg, XII Jahrg. 1870, p. 91/92.

³⁾ Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 272.

⁴⁾ In 62. Jahresbericht der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur, 1885, p. 316.

2. *Hieracium nigrescens* Willd.¹⁾ = *H. alpinum* 3. Halleri W. Gr.²⁾ ist eine Sippe, die in ihrer Ausbildung zwischen *H. atratum* und *alpinum* steht.

Für die Verwandtschaft des *H. nigrescens* mit *H. atratum* sprechen: Die breitliche, zuweilen fast runde Gestalt der Grundblätter — diese erreichen, wenn schmaler, doch nie die Schmalheit der Grundblätter von *H. alpinum*; die Zähnelung der Grundblätter; das nicht seltene Vorhandensein von zwei Stengelblättern; die gewöhnliche Mehrköfigkeit.

Für die Verwandtschaft des *H. nigrescens* mit *H. alpinum* sprechen: Die Art der Verzweigung — die Seitenäste entspringen fast stets aus tieferen Blattachsen als bei *H. atratum*; das nicht seltene Vorhandensein von einköpfigen Individuen; vor allem die bedeutende Grösse der Köpfe; schliesslich die schon reichere Zottenbehaarung.

Man dürfte demnach in *H. nigrescens* einen Bastard zwischen *H. atratum* und *alpinum* erblicken; die Standortsverhältnisse widersprechen dieser Ansicht jedoch. Denn *H. nigrescens* tritt in Schottland auf, wo *H. atratum* fehlt. Man wird deshalb zu der Anschauung geführt, dass *H. nigrescens* ein Bastard zwischen *H. murorum* und *alpinum* sei, denn die oben als für die Verwandtschaft mit *H. atratum* sprechend angeführten Tatsachen lassen sich auf *H. murorum* ebenso gut beziehen.

Als Bastard zwischen *H. alpinum* und *murorum* war früher bereits *H. atratum* gedeutet worden, aber ausdrücklich vermerkt, dass er nach *H. murorum* hin goneoklin sei. Dieser Fall liegt bei *H. nigrescens* nicht vor; man muss in ihm einen nach *H. alpinum* hin goneoklinen oder intermediären Bastard erblicken. Dass unter diesen Umständen auch die Aehnlichkeit von den oft verwechselten *H. nigrescens* und *atratum* bedingt wird, liegt auf der Hand.

¹⁾ Willdenow, Enumeratio Plantarum Horti Botanici Berolinensis, 1809, p. 823.

²⁾ Flora Silesiae III, 1829, p. 180.

Der hier entwickelten Auffassung stehen die Standortsverhältnisse nicht im Wege. *H. nigrescens* ist trotz seiner Verbreitung im Riesengebirge seltener als *H. atratum*, ebenso wie *H. alpinum* seltener als *H. Wimmeri* ist.

Wimmer und Grabowki stellten *H. nigrescens* noch zu *H. alpinum* unter dem Namen β . Halleri. Diese Massnahme war entschieden irrtümlich und wurde später von Wimmer aufgegeben¹⁾; er zog später zu *H. nigrescens* *H. atratum* unter dem Namen β multiflorum. Diese Vereinigung aber umfaßt eine zu grosse Zahl von in ihren Extremen allzu weit von einander stehenden Formen, denn schon *H. atratum* allein ist polymorph. Uechtritz erkannte mit Rücksicht auf diese Tatsache bereits *H. atratum* und *nigrescens* als zwei getrennte Arten an²⁾, stellte jedoch zu *H. nigrescens* als Varietät das *H. decipiens* Tsch.. Das ist gleichfalls irrtümlich, denn *H. decipiens* steht dem *H. alpinum* entschieden näher als dem *H. nigrescens*, worauf auch G. Schneider in seiner Monographie verweist³⁾. Er will, wie das auch hier geschieht, *H. nigrescens* als Mittelsippe zwischen *H. murorum* und *alpinum* gedeutet wissen⁵⁾.

3. *Hieracium glandulosodentatum* Uechtr.⁴⁾ = *H. apiculatum* u. *tortuosum* Tsch.⁵⁾ steht dem *H. nigrescens* habituell am nächsten. In der Flora von Schube⁶⁾ sowohl wie in Schneiders Monographie⁷⁾ und Fieks Flora⁸⁾ sind deshalb auch beide Hieracien zusammengestellt.

Uechtritz weist in seiner Originaldiagnose auf die Aehnlichkeit der beiden Sippen hin, will sie aber durchaus geschieden wissen, und Schneider, Schube und auch die vorliegende Arbeit erkennen diese Scheidung an.

¹⁾ Flora von Schlesien 1857, p. 310.

²⁾ Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 268 u. 274.

³⁾ R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 65.

⁴⁾ Uechtritz in 53. Jahresbericht der schles. Gesellsch für vaterl. Cultur, 1876, p. 143.

⁵⁾ Tausch, in sched. u. Flora XX, 1837, Beiblätter No. 5. p. 70.

⁶⁾ p. 146.

⁷⁾ R. W. B. XI, 1891, 3 u. 4 p. 27/28.

⁸⁾ p. 268/269

Man hat in *H. glandulosodontatum* wohl nichts anderes als einen Bastard zwischen *H. alpinum* und *vulgatum* zu erblicken. Da in diesem Falle das *H. glandulosodontatum* dem *H. alpinum* nicht ferner steht als das *H. nigrescens*, und überdies *H. murorum* und *vulgatum* zuweilen in einander nicht ganz unähnlichen Formen anzutreffen sind, so erklärt sich auch die äussere Aehnlichkeit von *H. nigrescens* und *glandulosodontatum*.

Für die Verwandtschaft der letzteren mit *H. alpinum* sprechen: Das stetige Verhandensein mehrerer oder vieler Grundblätter zur Blütezeit, die Art der Stengelverzweigung, die meist ziemlich geringe Zahl der Köpfe und ihre Grosse.

Für die Verwandtschaft des *H. glandulosodontatum* mit *vulgatum* sprechen: Die scharfzugespitzte Gestalt der Blätter; das Vorhandensein reichlicher Blattbezahnung; das Auftreten von 1 oder 2 Stengelblättern; die Mehrköpfigkeit; schliesslich die Zunahme der Drüsenhaarbekleidung.

Aus dem Vorkommen des *H. glandulosodontatum* erwächst der Auffassung von seiner Bastardnatur zwischen *H. alpinum* und *vulgatum* keinerlei Schwierigkeit. Dieser Bastard steht in seiner typischen Ausbildung ziemlich genau zwischen den beiden Eltern, darf also als intermediär gelten. Aber es kommen noch mannigfaltige Formen vor, die Mittelglieder zwischen *H. glandulosodontatum* und *vulgatum* darstellen. Von *H. vulgatum* sind sie wegen der auffallenden Zähnelung der Blätter und der immer noch bedeutenderen Kopfgrösse leicht zu unterscheiden. Sie können nun entweder als zu *H. vulgatum* hinneigende goneokline Bastarde zwischen *H. alpinum* und *vulgatum* gedeutet werden, oder als sekundäre Bastarde zwischen *H. glandulosodontatum* und *vulgatum* oder auch als Varietäten von *H. glandulosodontatum* oder *vulgatum*. Alle Fälle sind durchaus möglich, sogar nebeneinander denkbar, und deshalb ist keine Entscheidung zu treffen.

Die hier vorgetragene Ansicht über die Bastardnatur des *H. glandulosodontatum* zwischen *H. alpinum* und *vulgatum* stimmt mit der Anschauung G. Schneiders überein¹⁾.

¹⁾ vergl. R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 65.

4. *Hieracium riphaeum* Uechtr.¹⁾ hat zweifellos mit *H. prenanthoides* ziemlich grosse Aehnlichkeit, und wenn man auch schon vor Uechtritz die Sippe kannte, so glaubte man stylöse Individuen von *H. prenanthoides* vor sich zu haben, und achtete nicht auf die weiteren nicht unbeträchtlichen Unterschiede. Diese setzt Uechtritz trefflich auseinander²⁾. Am meisten habituelle Aehnlichkeit hat *H. riphaeum* mit *H. bohemicum*; Uechtritz ist deshalb geneigt, *H. riphaeum* als Mittelform zwischen *H. bohemicum* und *prenanthoides* aufzufassen. Diese Anschauung aber ist, falls mit der Bezeichnung Mittelform ein Bastard gemeint ist, nicht geeignet, die vorherrschende Stylosität der Blüten zu erklären, denn sowohl bei *H. prenanthoides* als auch bei *H. bohemicum* ist eine solche wohl noch nie beobachtet worden. Ferner sind die Blätter von *H. prenanthoides* denen von *H. bohemicum* ähnlicher als denen von *H. riphaeum*, nicht nur in Bezug auf die Spreite, die bei *H. riphaeum* nie geigenförmig verengt ist, sondern auch auf die Basis.

Die überaus häufige Ausbildung von stylösen Blüten weist uns die Richtung, in der *H. riphaeum* von *H. prenanthoides* aus seine Entwicklung genommen haben muss. Wir werden unmittelbar auf die Sectio Alpina geführt, denn hier gerade ist die Stylosität eine häufige Erscheinung. Bei *H. alpinum* selbst ist sie verhältnismässig selten, sehr häufig dagegen bei *H. polymorphum*.

Für die Verwandtschaft des *H. riphaeum* mit *prenanthoides* sprechen: Das vorherrschende Absterben der Grundblätter vor der Blütezeit; die halbumbfassenden Stengelblätter, das Verhältnis ihrer Länge zur Breite, das auch bei schmalblättrigen Individuen im allgemeinen stets dem der *Prenanthoides*-Blätter näher kommt als dem der allzu schmalen *Polymorphum*-Blätter; die abstehende Stellung der Stengelblätter.

Für die Ableitung des *H. riphaeum* von *H. polymorphum* sprechen ausser dem Vorherrschen der Stylosität der

¹⁾ Ö. B. Z., XXII. Jg. 1872, p. 41—44.

²⁾ Ö. B. Z., XXII. Jg. 1872, p. 42.

Blüten: Die geringere Zahl der Stengelblätter, 5–6 im Mittel, als bei *H. prenanthoides*; ihre weiter auseinander gerückte Stellung; die Art der Stengelverzweigung, die der von *H. bohemicum* gleicht; die meist ziemlich geringe Zahl der Köpfe; ihre Grösse, welche die von *H. prenanthoides* übertrifft und etwa der von *H. bohemicum* gleicht.

Somit darf die hybride Entstehung aus diesen beiden angenommen werden. Auch die Standortverhältnisse gestatten das. Und die Ausbildungsart der Stylosität, die lediglich nur in der teilweisen Reduktion der Ligulae besteht, macht sogar den Eindruck, als sei sie das Produkt einer Mischung typisch stylöser Röhrenblüten und nicht stylöser Blüten.

Bereits früher wurde *H. bohemicum* als Bastard zwischen *H. prenanthoides* und *polymorphum* gedeutet. In *H. rhiphaeum* tritt uns ein anders ausgebildeter Bastard zwischen den gleichen Eltern entgegen. Diese sehr nahe Verwandtschaft mit *H. prenanthoides*, die Uechtritz trotz der Unterschiede dem *H. rhiphaeum* zuschreibt¹⁾, ist in der Tat nicht zu verkennen, und gerade die Stellung der Blätter, die bei *H. bohemicum* ziemlich aufrecht ist, bei *H. rhiphaeum* aber einen weit grosseren Winkel mit dem Stengel bildet, weist *H. rhiphaeum* näher an *H. prenanthoides*.

Ist *H. rhiphaeum* eine Hybride jener Eltern, so muss es Aehnlichkeit nicht nur mit *H. bohemicum*, sondern auch mit *H. pedunculare*, das als Bastard zwischen *H. bohemicum* und *polymorphum* aufgefasst wird, haben. Eine solche ist, wenn man zwei wenigköpfige Durchschnittformen mit einander vergleicht, nicht gänzlich zu leugnen. *H. pedunculare* steht dem *H. polymorphum* jedoch näher als das *H. rhiphaeum*, ebenso klingt *H. rhiphaeum* mehr an *H. bohemicum* als an *H. pedunculare* an.

5. Hieracium corconticum K. Knaf²⁾ und

¹⁾ Fieck, Flora von Schlesien, 1881, p. 262.

²⁾ Čelakovsky in Ö. B. Z., XXXIII. Jg. 1883, p. 79–82.

6. *Hieracium asperulum* Freyn¹⁾ werden von G. Schneider unter dem Namen *H. juranum* Fries vereinigt²⁾. Die Schubesche Flora nimmt von dieser Nomenklatur Abstand und stellt *H. asperulum* als Varietät zu *H. corconticum*³⁾.

Die Originaldiagnose für *H. juranum*⁴⁾ wurde auf Grund von Individuen aus dem Schweizer Jura und den Alpen angefertigt. Diese Individuen weichen von *H. corconticum* sowohl wie von *H. asperulum* meist ab, was weniger deutlich aus der Beschreibung, deutlich aber aus den Originalen des Breslauer botanischen Gartens hervorgeht. Das Friessche *H. juranum* ist eine durchaus polymorphe Sippe, und es finden sich auch Formen, die an *H. corconticum* und *H. asperulum* sehr lebhaft erinnern. Das ist es jedenfalls, was Schneider bewog, *H. corconticum* und *asperulum* als zwei Riesengebirgsvertreter dem *H. juranum* unterzuordnen.

Gleichwohl erscheint es mir nicht angebracht, diesen gemeinschaftlichen Namen schon jetzt endgültig anzunehmen, weil die Spezies allem Anscheine nach noch nicht genügend sicher bekannt ist. In dem Herbarmaterial des Breslauer Gartens finden sich jedenfalls noch verschiedene Formen unter dem Namen *H. juranum*. Es ist daher wahrscheinlich, dass *H. juranum* tatsächlich noch andere, bisher nur als Varietäten betrachtete Arten in sich schliesst. Die Riesengebirgspflanzen stellen vielleicht solche dar, eine Annahme, die um so näher liegt, als das Verbreitungsgebiet dieser Hieracien so sehr isoliert ist. Andererseits ist nicht ausser acht zu lassen, dass die Stammformen, die *H. asperulum* und *corconticum* gebildet haben (*H. prenanthoides* und *vulgatum*), in andern Gebieten meist in etwas abweichenden Formen auftreten; infolgedessen müssen auch die abgeleiteten Formen meist abweichend sein, und es ist demnach natürlich nicht ausgeschlossen, dass fernere Untersuchungen dennoch zu dem

¹⁾ Flora, 1881, p. 217.

²⁾ R. W. B. XIII, 1895, 1 u. 2 p. 21/22.

³⁾ p. 419.

⁴⁾ *Epicrisis generis Hieraciorum*, 1862, p. 104/105.

Ergebnis gelangen, das *H. corconticum* und *asperulum* nur Varietäten des polymorphen *H. juranum* sind. Vorläufig aber erscheint es ratsam, beiden Sippen ihren Namen als Speziesbezeichnung zu belassen. Man darf sagen, dass beide Hieracien in den Alpen durch bestimmte Formen des *H. juranum* ersetzt werden. In den Karpaten ist es *H. pocuticum* Wok., das sich als Parallelsippe zu *H. asperulum*, *corconticum* und *juranum* auffassen lässt.

H. corconticum und *asperulum* sind nahe verwandt, aber wohl unterscheidbar, denn *H. corconticum* hat im Vergleich zu *H. asperulum* breitere, deutlicher halbstengelumfassende, ein wenig stärker gezähnte Blätter mit grossen Blattohren und etwas stumpferer Spitze.

Seinem Habitus nach steht *H. asperulum* ungefähr in der Mitte zwischen *H. prenanthoides* und *vulgatum*.

Auf *H. prenanthoides* deutet lediglich die halbstengelumfassende Gestalt der Blätter, deren unterste sogar noch zuweilen etwas geigenförmig verengt sind, auf *H. vulgatum* die Schmalheit und spitze Form der Blätter, die meist geringere Blätter- und Kopfzahl als bei *H. prenanthoides*. *H. asperulum* erinnert habituell recht wohl an *H. vulgatum*, und die manchmal vorkommende Erhaltung der Grundblätter bis zur Blütezeit ist durch die Verwandtschaft mit *H. vulgatum* auch erklärbar.

H. corconticum erinnert etwas mehr an *H. prenanthoides*. Die breiteren Blätter sind etwas deutlicher geigenförmig verengt und umfassen den Stengel vollkommener als bei *H. asperulum*. Auf Einwirkung des *H. vulgatum* lässt sich auch hier die zuweilen vorkommende Erhaltung der Grundblätter bis zur Blütezeit, ferner die meist geringere Zahl der Blätter und Köpfe als bei *H. prenanthoides* zurückführen.

Man darf für *H. asperulum* sowohl wie für *corconticum* eine hybride Entstehung zwischen *H. prenanthoides* und *vulgatum* annehmen. Beide Sippen gehören, wie das von allen Forschern anerkannt wird, eng zusammen und dürfen als Parallellformen aufgefasst werden, wenn man annimmt, dass ein breitblättriges *H. prenanthoides* als Elternart bei

der Entstehung des *H. corconticum* fungierte, ein schmalblättriges bei der Bildung des *H. asperulum*.

Es lässt sich hieraus die etwas grössere Aehnlichkeit des *H. corconticum* mit *H. prenanthoides* und auch die Aehnlichkeit mit *H. albinum* wohl verstehen. Wer aber nicht geneigt ist, jene Erklärung anzunehmen, ist berechtigt, in *H. asperulum* einen zu *H. vulgatum* goneoklinen oder einen intermediären Bastard zu erblicken, in *H. corconticum* einen dem *H. prenanthoides* sich nähernden. Einfacher erscheint jedenfalls der erste Erklärungsversuch.

Uechtritz enthält sich eines Urteils über die Entstehung der beiden Sippen, ist sich aber wohl bewusst, dass die einzelnen Glieder des polymorphen *H. juranum* „vielfach als Hybride zwischen *H. prenanthoides* Vill. und den *Vulgatis* . . . gedeutet worden sind¹⁾“. Er kommt darauf anlässlich einer Bemerkung über *H. Freynianum* Velen. zu sprechen. Uechtritz selbst misst diesem *Hieracium* dort wenig eignen Wert zu und will es mit seinem *H. juranum* in engste Beziehung gesetzt wissen. Nach Schneiders Monographie²⁾ stellt es neben der forma 2. *Trautmanni* Uechtr. eine Unterform des *H. corconticum* dar. Und es muss Schneider entschieden beigepflichtet werden, wenn er jene Ausbildungsformen für die Systematik nur als unwesentlich hinstellt. Die Diagnosen allein genügen, um in der forma 1. *Freynianum* Velen. ein robustes Individuum von *H. corconticum* zu erkennen, in der forma 2. *Trautmanni* ein schwächeres. Selbst die Farbe der Blätter ist bei dieser Form nicht so lebhaft grün wie bei jener.

7. *Hieracium Engleri* Uechtr.³⁾ = *H. dovrense* Engler⁴⁾ = *H. rupestre* γ *molle* Wimm.⁵⁾. Es liegt nahe, für dieses

¹⁾ in 61. Jahresbericht der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur, 1884, p. 262.

²⁾ R. W. B. XIII, 1893, 1 u. 2 p. 22.

³⁾ Ö. B. Z., XXI. Jg., 1871, p. 294.

⁴⁾ in 47. Jahresb. der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur, 1870, p. 108.

⁵⁾ Flora von Schlesien, 1844, p. 467.

Hieracium wegen seiner Seltenheit hybride Entstehung anzunehmen, falls man nicht in ihm ein Relikt erblicken will. Aber die bedeutende Länge der Kopfhenschuppen ist für *H. Engleri* ein typisches Merkmal, das es vor allen andern Sippen unserer Gruppen auszeichnet; es mit diesen Sippen in Verbindung zu bringen, erscheint daher zunächst fraglich. Gleichwohl muss man bedenken, dass bei der Bastardbildung nicht immer Sippen entstehen, deren morphologische Eigenschaften vollkommen auf die der Eltern passen. So wurde früher die dunkle Farbe der Köpfe von *H. bohemicum* und *Wimmeri* nicht besonders betont, obwohl die Stammeltern kaum so dunkle Köpfe haben. Es ist also eine Variation zugleich mit der Bastardbildung in Erscheinung getreten, und das darf man vielleicht auch für die Kopfschuppen des *H. Engleri* annehmen.

Weitere Merkmale des *H. Engleri* sind die ziemlich blasse Blattfarbe und die überaus geringe Entwicklung oder das völlige Fehlen der Drüsenhaarbekleidung. Diese beiden Eigenschaften zugleich kommen dem *H. caesium* zu und es ist möglich, in *H. Engleri* einen Bastard zwischen *H. caesium* und *prenanthoides* zu erblicken. Die Standortverhältnisse widersprechen dem nicht.

Für die Verwandtschaft des *H. Engleri* mit *caesium* sprechen: Das Vorhandensein einiger Grundblätter zur Blütezeit; die mattgrüne, etwas glaucescierende Blattfarbe die Ausbildung des Indumentes. Die Grosse der Köpfe ist bei *H. caesium* manchmal die gleiche wie bei *H. Engleri*, meist ist sie geringer; aber der Grossenunterschied beruht vorzugsweise auf der Länge der Hüllschuppen des *H. Engleri*. Auch die geringe Kopffzahl des *H. Engleri* lässt sich auf *H. caesium* beziehen, desgleichen die geringe Stärke des Stengels.

Für die Verwandtschaft des *H. Engleri* mit *prenanthoides* sprechen: Das vorherrschende Fehlen der Blattbezahnung; die allmähliche Verschmälerung der Grundblätter zu einem geflügelten Stiele; die meist grössere Zahl oder mindestens kräftigere Ausbildung der Stengelblätter als bei *H. caesium*; vor allem ihre halbstengelumfassende Gestalt.

Man darf also nach dem Gesagten in *H. Engleri* einen Bastard zwischen *H. caesium* und *prenanthoides* erblicken, der nach *H. caesium* hin schwach goneoklin ist. Da *H. caesium* dem *H. vulgatum* nicht sehr fern steht, erklärt sich somit auch die habituelle Aehnlichkeit des *H. Engleri* mit *H. asperulum*.

Zahn¹⁾ erblickt in *H. Engleri* als einer dem *H. chlorocephalum* verwandten Sippe eine Form *H. prenanthoides* — *alpinum* — *vulgatum*. Aber diese Ansicht kann morphologisch nur dann gelten, wenn man vom Indument, den Kopfhüllen und der Blattfarbe absieht; eine direkte Ableitung ist aber ausgeschlossen, denn *H. bohemicum* wie die andern vielleicht in Betracht kommenden Zwischenformen von *H. alpinum* und *prenanthoides* fehlen im Gesenke. Uechtritz äusserst sich in seiner Originalbeschreibung²⁾ dahin, dass er *H. Engleri* mit keiner andern Sippe recht in Verbindung zu bringen wisse.

Von Uechtritz, Schneider und Schube wird *H. Engleri* als gute Art anerkannt. Mit Rücksicht auf seine grosse Seltenheit aber erscheint es geratener, es als eine noch nicht selbständige Sippe zu betrachten, obwohl die Konstanz seiner Merkmale nicht zu leugnen ist. Dazu kommt, dass Professor Pax in den Rodnaer Alpen der Ostkarpaten inmitten von *H. caesium* auf Kalksubstrat Formen gesammelt hat, die von *H. Engleri* kaum verschieden sind. In demselben Gebiet ist auch *H. prenanthoides* entwickelt. Das von Uechtritz bestätigte³⁾ Vorkommen des *H. Engleri* im Gebirge Kom Montenegros ist auf Grund des Breslauer von Uechtritz bestimmten Originalexemplares von diesem Standorte vielleicht dennoch nicht völlig mit dem sudetischen *H. Engleri* identisch.

¹⁾ in Kochs Synopsis der Deutschen und Schweizer Flora, 3. Aufl., p. 1889.

²⁾ Ö. B. Z., XXI. Jg., 1871, p. 294.

³⁾ Uechtritz, in Ö. B. Z., XXIV. Jg., 1874. p. 136 und Fiek, Flora von Schlesien, Einleitung p. 107.

8. *Hieracium pseudalbinum* Uechtr.¹⁾ ist eine Sippe, die die Mitte zwischen *H. Wimmeri* und *bohemicum* hält.

Für die Verwandtschaft des *H. pseudalbinum* mit *Wimmeri* sprechen die verhältnismässige Breite der Grundblätter und die Kleinheit der Köpfe. Für *H. bohemicum*: Die geringe Zahl der Grundblätter zur Blütezeit (gewöhnlich nur 1 oder 2, oft gar keines), die Zahl der Stengelblätter, die bei *H. Wimmeri* nur 2—3 im Mittel, bei *H. pseudalbinum* aber 4—5 beträgt; ferner die Stellung der Stengelblätter, die gleichwie bei *H. bohemicum* nur in geringem Winkel vom Stengel abstehen; schliesslich die halbstengelumfassende, breitgeflügelte Gestalt der Blattstiele, die besonders auffällig beim 1. u. 2. Blatte ist und nach oben zu an Deutlichkeit abnimmt.

Nach dem Gesagten darf *H. pseudalbinum* als Bastard zwischen *H. Wimmeri* und *bohemicum* aufgefasst werden. Ich selbst fand z. B. im langen Grunde die Hieracien *pre-nanthoides*, *murorum*, *Wimmeri*, *bohemicum* und *pseudalbinum* zusammen in ziemlich grosser Zahl unmittelbar durcheinander stehend. Doch darf nicht unerwähnt bleiben, dass am Kiesberg *H. pseudalbinum* wächst, während dort *H. Wimmeri* fehlt²⁾. Immerhin ist diese Tatsache nicht sehr befremdlich, weil es sich nicht um grosse Entfernungen handelt; die nächsten Fundorte des *H. Wimmeri* sind der Melzergrund und das Teufelsgärtchen.

In der hohen Tatra und im Gesenke kommt *H. pseudalbinum* nicht vor; das spricht für die oben entwickelte Ansicht, weil in jenen Gebirgen *H. bohemicum* fehlt.

Uechtritz ist geneigt, dem *H. pseudalbinum* zwischen *H. albinum* und *erythroprodum* einen Platz anzuweisen³⁾. Das ist aber deshalb nicht gutzuheissen, weil *H. pseud-*

¹⁾ In Ö. B. Z., XXXV. Jg., 1885, p. 366 (Nomen) u. in 62. Jahresb. der schles. Gesellsch. für vaterl. Cult. für 1884, Breslau 1885, p. 316.

²⁾ nach G. Schneider, R. W. B. XII, 1892, 3. u. 4 p. 68.

³⁾ 62. Jahresbericht der schles. Gesellsch. für vaterl. Cultur für 1884, Breslau 1885, p. 316.

album entschieden häufiger als *H. erythropodum*, vielleicht auch als *H. album* ist, und besonders deshalb, weil *H. erythropodum* im Westen des Riesengebirges fehlt, wo *H. pseudalbum* auftritt.

Ueber den Verwandtschaftskreis, in den *H. pseudalbum* gehört, sind sich Uechtritz, Schneider und Schube enig. Wenn aber Schube das *H. pseudalbum* als Varietät von *H. album* auffasst, so kann hier dieser Anschauung nicht beigeprflichtet werden. Denn Zahl, Stellung und Form der Blätter sind zu auffallend, als dass sie nur der Einwirkung der Variabilität zugeschrieben werden dürften. Auch G. Schneider, der in einer früheren Abhandlung¹⁾ die Ansicht vertritt, *H. album* und *pseudalbum* seien zu vereinigen, hat in seiner Monographie diese Anschauung aufgegeben und behandelt beide Sippen unabhängig von einander²⁾. Auch Uechtritz weist in seiner Originaldiagnose besonders darauf hin, dass beide nicht zusammenzuziehen seien, weil *H. album* zweifellos Aehnlichkeit mit *H. murosorum* habe, bei *H. pseudalbum* davon aber keine Rede sein könne.

9. *Hieracium erythropodum* Uechtr. und

10. *Hieracium corruptum* G. Schnd. *H. erythropodum* Uechtr.³⁾ = *H. album* 3) *dentatum* Freyn⁴⁾ wird von G. Schneider als Bastard zwischen *H. pseudalbum* und *vulgatum* aufgefasst⁵⁾, einerseits wegen der morphologischen, andererseits wegen der standörtlichen Verhältnisse. Er führt allerdings von 7 Standorten deren 2 auf, wo *H. erythropodum* nicht in Gesellschaft von *H. pseudalbum* stand. Am reichlichsten findet sich *H. erythropodum* nach dem mir zu Gebote stehenden Material am Kiesberge, und dort tritt auch *H. pseudalbum* auf.

1) Deutsche botanische Monatsschrift, 1888, p. 136, No. 16.

2) R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 67/68.

3) Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 272.

4) Čelakovsky, Prodrömus Florae Bohemicae 1867, p. 790.

5) R. W. B. XIV, 1894, 1 u. 2 p. 24.25.

Es ist schwierig, durch eine Analyse der Eigenschaften des *H. erythropodum* seine Verwandtschaft zu *H. vulgatum* auszudrücken. Klarer als jede Beschreibung ist vielleicht die Angabe, dass *H. erythropodum* gleichsam ein *H. vulgatum* mit halbstengelumfassenden Blättern ist. Die habituelle Aehnlichkeit mit *H. vulgatum* kann kaum bestritten werden, auch Uechtritz betont sie besonders¹⁾. Die halbstengelumfassende Gestalt der Blätter bildet das Hauptmerkmal für die Verwandtschaft mit *H. pseudalbinum*. Die Individuen mit 3 oder mehr Stengelblättern erinnern in ihrem Aeusseren am meisten an dieses letztere, die mit einem bis höchstens 3 Blättern am meisten an wenigblättrige Formen von *H. vulgatum*. Aber diese lassen sich durch die Lage der Grundblätter von *H. erythropodum*, bei dem sie sich stets fast gerade aufrecht über den Boden erheben, ziemlich gut unterscheiden.

G. Schneider gibt von *H. erythropodum* zwei Varietäten an, 1) *genuinum*, 2) *subintegrifolium* G. Schn. . Der Hauptunterschied ist die durchschnittliche Zahl der Stengelblätter, die bei var. *genuinum* 3, bei *subintegrifolium* 2 beträgt, und die Zähnelung, die bei var. *genuinum* stets scharfe, wenn auch verschieden grobe, bei *subintegrifolium* nie scharfe Ausbildung zeigt. Var. *genuinum* neigt im Habitus mehr zu *H. pseudalbinum* hin, unterscheidet sich jedoch durch die reichliche auf *H. vulgatum* deutende Zähnelung der Blätter, var. *subintegrifolium* mehr zu *H. vulgatum* hin, hat aber die ärmere Blattbezeichnung von *H. pseudalbinum*.

Die im Breslauer Herbarium befindlichen Individuen lehren, dass die Scheidung Schneiders die Varietäten auseinanderhalten lässt. Gleichwohl hat sie nur insofern eigentlichen Wert, als man dadurch in den Stand gesetzt wird, eine 3., von Schneider *H. corruptum*²⁾ benannte Sippe zu beurteilen.

¹⁾ 62. Jahresbericht der schles. Gesellsch. für vaterl. Cult. für 1884, Bresl. 1885, p. 316.

²⁾ Deutsche Botanische Monatschrift, 1888, p. 123 u. R. W. B. XIV, 1894, 1 u. 2 p. 25.

Diese letztere ist entweder ein Bastard zwischen *H. erythropodum* und *vulgatum* — sie findet sich stets in Gesellschaft beider am Kiesberge — oder als Varietät der einen oder der andern Sippe aufzufassen. Sie ist am besten dadurch gekennzeichnet, dass man im Zweifel bleibt, ob man sie zu *H. vulgatum* oder *erythropodum* stellen soll.

Als „gute Art“ ist *H. erythropodum* unter keinen Umständen anzusprechen; denn bei seiner Seltenheit verrät es zugleich deutlich seine Bastardnatur. Und es wurde von Schneider beobachtet, dass es nur in einzelnen Jahrgängen häufiger auftritt, in manchen dagegen zu fehlen scheint¹⁾. Wir müssen also in ihm einen Bastard erblicken, der jährlicher Neubildung unterliegt und nicht einmal sehr erhaltungsfähig ist.

Die Möglichkeit, dass *H. erythropodum* ein Bastard zwischen *H. Wimmeri* und *vulgatum* sei, hat nach den letzten Tatsachen wenig für sich, obwohl gerade mit *H. Wimmeri* das *H. erythropodum* öfter verwechselt wurde. Aber das sporadische Auftreten des letzteren würde doch dann unter allen Umständen die unmittelbare Anwesenheit des *H. Wimmeri* erfordern, wenigstens an den Stellen, wo *H. erythropodum* am häufigsten ist, am Kiesberge, und gerade dort fehlt *H. Wimmeri*.

Eine Verwandtschaft mit andern Sippen, die ganz oder halbstengelumfassende Blätter besitzen, wie *H. bohemicum* oder *preanthoides*, würde den Habitus des *H. erythropodum* nicht gut zu erklären vermögen. Eine Verwandtschaft mit *H. albinum* müsste sich im allgemeinen in breiteren Blättern aussprechen und würde, wie auch eine solche mit *H. corconiticum* oder *asperulum*, wegen der Standorte nicht als wahrscheinlich gelten können.

11. Fernere Bastarde. Zum Schlusse muss noch daran erinnert werden, dass unter den überaus vielen Uebergängen, die sich bei den Hieracien nach fast allen Richtungen hin finden, auch gelegentlich noch andere bisher unerwähnt ge-

¹⁾ E. W. B. XIV, 1894, 1 u. 2 p. 25.

bliebene Sippen auftreten, in denen man nach den morphologischen Verhältnissen zwei bestimmte Stammeltern erkennen kann. Solche Sippen werden meist als Bastarde gedeutet, können es sehr wohl auch sein; ihre Entstehung würde aber jedenfalls oft ebensogut durch Variabilität erklärt werden können.

G. Schneider unterscheidet in seiner Monographie noch folgende als Bastarde gedeutete Sippen der hier in Betracht kommenden Gruppen:

a) *H. dubiosum* G. Schn.¹⁾ = *H. tubulosum* × *decipiens*
b) *H. pseudodecipiens* G. Schn.²⁾ = *H. eximium* var. *calenduliflorum* × < *decipiens*).

c) *H. Sagorskii* G. Schn.³⁾ = *H. nigrescens* × *decipiens*, eine Sippe, die zur Verwechselung von *H. nigrescens* und *decipiens* Anlass geben kann.

d) *H. pseudeximium* G. Schn.⁴⁾ = *H. decipiens* > × *bohemicum*.

e) *H. Pseudo-Wimmeri* G. Schn.⁵⁾ = *H. murorum* × *Wimmeri*.

f) *H. intermedium* G. Schn.⁶⁾ = *H. caesium* var. *alpestre* × *glandulosodontatum*.

In der Schubeschen Flora⁷⁾ ist noch ausserdem *H. prenanthoides* × *sudeticum* (= *bohemicum*) angegeben.

Sämtliche Sippen sind, wenn auch stellenweise in grösserer Zahl entwickelt, im allgemeinen doch selten; es erübrigt sich, sie näher zu besprechen, weil die Diagnosen in Schneiders Monographie die oben angeführten Kombinationen wahrscheinlich machen. *H. dubiosum* und *pseudodecipiens* sind seltene primäre Bastarde, die andern sekundäre, die nur im Range von *H. erythropodum* stehen, das lediglich deshalb genauer besprochen wurde, weil es eine schon seit langer Zeit erkannte Sippe darstellt.

¹⁻³⁾ Deutsche Botanische Monatsschrift, 1888, p. 122 u. R. W. B. XII, 1892, 1 u. 2 p. 24 u. 25.

⁴⁾ Ö. B. Z. XXXVI, 1886, p. 23 u. XXXVII, 1887, p. 308.

⁵⁻⁶⁾ Deutsche Botanische Monatsschrift, 1888, p. 122 u. R. W. B. XIV, 1894, 1 u. 2 p. 23.

⁷⁾ p. 425.

γ. Variationen.

1. *Hieracium eximium* Backh.¹⁾ = *H. alpinum* var. 3. Halleri β spatulatum Wimm.²⁾ = *H. apiculatum* Tsch.³⁾ ist eine in 2 Varietäten, dem typischen *H. eximium* und der var. *calenduliflorum* Backh.⁴⁾ entwickelte Sippe. Von diesen Varietäten gehört dem Riesengebirge das typische *H. eximium* nicht an, wenigstens sind bisher keine sicheren Belege dafür vorhanden. Ein Exemplar des Breslauer Herbariums freilich kommt ihm sehr nahe, dürfte aber doch besser zur var. *calenduliflorum* gerechnet werden.

Diese letztere Varietät ist im Riesengebirge nachgewiesen, allerdings nur im östlichen Teile, kommt aber ausser in den Ostsudeten (Glatzer Schneeberg, Gesenke) auch in der hohen Tatra, den Alpen, Schottland und Skandinavien vor.

G. Schneider sieht in der var. *calenduliflorum* eine selbständige Sippe⁵⁾; Uechtritz und Fiek war es bekannt, dass beide Varietäten früher getrennt behandelt wurden; dennoch vereinigten sie dieselben⁶⁾. Auch Schubes neue Flora⁷⁾ erkennt die wieder aufgenommene Scheidung Schneiders nicht an. Ich bin der Ansicht, dass die Unterschiede, die das *H. eximium* zu einem von *H. calenduliflorum* „total verschiedenen“ *Hieracium* stempeln sollen, doch tatsächlich sehr gering sind, und schliesse mich deshalb der Anschauung von Uechtritz an.

Es ist wohl kaum zu bestreiten, dass *H. eximium* dem *H. alpinum* sehr nahe steht; es gibt sogar eine Form, die von *H. alpinum* zu ihm hinüberleitet, nämlich die von G. Schneider anerkannte var. *grande*⁸⁾. Früher wurde diese als nichts anderes als ein stark ausgebildetes Individuum von *H. alpinum* gedeutet. *H. eximium* nun ist

¹⁾ A Monograph of the british Hieracia, 1856, p. 20.

²⁻³⁾ in sched.

⁴⁾ A Monograph of the Brith Hieracia, 1856, p. 23.

⁵⁾ Ö. B. Z. XXXVII. Jg., 1887, p. 276–278.

⁶⁾ Fiek, Flora von Schlesien, 1881, p. 267/68.

⁷⁾ p. 416/17.

⁸⁾ vergl. R. W. B. XI, 1891, 1 u. 2. p. 34.

neben *H. tubulosum* das stärkste *Hieracium* der *Alpinum*-Gruppe und so wird man unmittelbar dazu geführt, in *H. eximium* eine besonders kräftig ausgebildete Form von *H. alpinum* zu erblicken, ausgezeichnet neben der extremen Kräftigkeit durch die reichere Sternhaarbekleidung ihrer Kopfschuppen und durch ihr häufiges Auftreten.

Zuweilen erscheint *H. eximium* auch in kleinen Individuen. Es liegt auf der Hand, dass das Auftreten solcher Zwergexemplare ganz ausgeschlossen sein müsste, wenn *H. eximium* eine nur gelegentlich zur Ausbildung gelangende Form von *H. alpinum* wäre. Wir haben vielmehr in ihm eine Varietät vor uns, die im Begriff ist, sich zu einer eignen Art auszugestalten.

H. eximium als eine Sippe zu deuten, die durch irgendwelche Bastardbildung entstanden sei, ist durchaus verfehlt. Man könnte höchstens als Eltern *H. alpinum* und *tubulosum* annehmen, aber *H. eximium* besitzt von Charakter des *H. tubulosum* nichts weiter als das Vorhandensein von Stengelblättern; ausserdem bleibt die Richtigkeit dieser Annahme wegen der Standortsverhältnisse ausgeschlossen.

Von *H. eximium* sind stylöse Formen beobachtet worden, jedoch ziemlich selten.

2. *Hieracium decipiens* Tsch.¹⁾ = *H. alpinum* β *melanocephalum* Wimm. ex. p.²⁾ *H. nigrescens* Velen.³⁾ ist gleichwie *H. eximium* eine Varietät von *H. alpinum*. Freilich ist sie schon weiter differenziert als *H. eximium* und hat insbesondere eine bestimmte Richtung eingeschlagen, in der sie variiert, nämlich gegen *H. nigrescens* Willd.. Mit diesem wurde *H. decipiens* daher öfter verwechselt; aber wenn G. Schneider⁴⁾ im Gegensatz zu der Uechtritzschen Bemerkung in Fieks Flora⁵⁾ betont, dass dem *H. decipiens* das *H. alpinum* tatsächlich näher stehe als das *H.*

¹⁾ in Flora XI, 1828, 1. Ergänzungsblätter, p. 66.

²⁾ Flora von Schlesien, 1857, p. 306.

³⁾ in sched.

⁴⁾ R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 65.

⁵⁾ p. 268.

nigrescens, so muss ihm hierin beigepflichtet werden. Auch Schube¹⁾ stellt *H. decipiens* als Nebenform zu *H. alpinum*.

Vor allem ist es die Form der Blätter, die viel eher mit *H. alpinum* als mit *nigrescens* in Verbindung gebracht werden kann. Die Unterschiede im Indument der Kopfhüllen sind schon geringer und auch weniger zuverlässig, aber sprechen ebenso eher für den engeren Zusammenhang mit *H. alpinum*. Die Gestalt der Hüllschuppen, die bei *H. nigrescens* schmaler als bei *H. decipiens* sein soll, ist nur im allgemeinen bezeichnend. Ein grosser Unterschied zwischen beiden Sippen ist also nicht festzustellen.

Man könnte nun in *H. decipiens* einen Bastard zwischen *H. nigrescens* und *alpinum* erblicken, denn auch die öfter vorkommende Mehrköpfigkeit und Stengelbeblätterung widersprechen dem keineswegs. Aber die Standortverhältnisse erlauben eine solche Auffassung nicht, weil *H. decipiens* in den Ostsudeten²⁾ auftritt, wo *H. nigrescens* fehlt. Ausserdem würde die Häufigkeit des *H. decipiens* im Riesengebirge mit der verhältnismässigen Seltenheit des *H. nigrescens* nicht im Einklange stehen.

H. glandulosodontatum besitzt mit *H. nigrescens* grosse Aehnlichkeit, zeichnet sich aber durch besonders starke, immer vorhandene Blattbezahnung aus. *H. decipiens* nun hat weit weniger gezähnelte Blätter selbst als *H. nigrescens* in den weniger bezähnten Formen. Eine Annäherung an *H. glandulosodontatum* besteht demnach in geringerem Masse als an *H. nigrescens*, und eine Bastardbildung aus *H. glandulosodontatum* und *alpinum* ist wegen der Standortverhältnisse ausgeschlossen.

Eine Annäherung an *H. polymorphum* wird, trotzdem *H. decipiens* oft 2 oder 3 Stengelblätter trägt, durch den Habitus widerlegt; die Verzweigungen stehen meist bogig ab, und auch der Hauptstengel zeigt oft starke Biegungen. Und gerade die var. *Fritzei* von *H. polymorphum* zeichnet

¹⁾ Schube, Flora von Schlesien, 1904, p. 416.

²⁾ Belegexemplar vom Glatzer Schneeberge im Bresl. bot. Gart.

sich durch grosse Steifheit aus, die var. *Uechtritziatum* ist, wenn auch zierlicher als die erste, doch immerhin ziemlich schlank emporgerichtet. Ausserdem lassen sich die meist breit spateligen Blätter des *H. decipiens* mit *H. polymorphum* nur schlecht in Einklang bringen.

Eine Annäherung des *H. decipiens* an *H. tubulosum* ist wegen des öfteren Auftretens mehrköpfiger Individuen nicht anzunehmen.

G. Schneider unterscheidet von *H. decipiens* 2 Varietäten: α occidentale β orientale¹⁾. Er gründet die Unterschiede in erster Linie auf die Dicke des Stengels und das Indument. Aus den Diagnosen geht deutlich hervor, dass die var. *occidentale* lediglich stärkere Individuen, die var. *orientale* schwächere umfasst. Diese letztere kommt im Riesengebirge nicht vor, sondern nur in den Ostsudeten, und dort ist *H. decipiens* überhaupt sehr selten. Schneider betont zudem, dass diese Varietät noch weiterer Beobachtung bedürfe.

Schneider glaubt von der Varietät des Riesengebirges wiederum 2 Unterformen unterscheiden zu müssen: 1. normale und 2. *brevipetiolatum*. Die erstere hat langgestielte Grundblätter, die letztere kurzgestielte. Hierin kann aber kein irgendwie zur Aufstellung zweier Unterformen zwingender Grund erblickt werden; Uebergänge mit mittellangen Blattstielen fehlen keineswegs und somit erscheint eine besondere Benennung der Formen überflüssig.

B. Tabellarische Uebersicht der besprochenen Sippen.

Die beigegegebene schematische Darstellung lässt als ein Entstehungszentrum *H. alpinum* erkennen. Um diese Art gruppieren sich in engem Kreise die oben als Variationen oder Mutationen gedeuteten *H. tubulosum*, *polymorphum*, *eximium* und *decipiens*.

Die Hauptarten *H. murorum*, *vulgatum* und *preanthoides* sind mit *H. alpinum* durch Bastarde verbunden.

¹⁾ Ö. B. Z. XXXVII, 1887, p. 312.

Die Reihe *H. alpinum* — *murorum* weist deren zwei primäre auf, das nach *H. alpinum* hin goneokline *H. nigrescens* und das nach *H. murorum* hin geneokline *H. atratum*. Von *H. alpinum* aus nähert sich dem *H. nigrescens* *H. decipiens*, und noch zwischen diesen beiden letzten ist der sekundäre Bastard *H. Sagorskii* eingeschaltet. *H. atratum* ist eine sehr polymorphe Art und variiert sowohl nach *H. nigrescens* als auch nach *H. murorum* hin. Die Reihe *H. alpinum* — *murorum* ist somit überaus dicht besetzt und stellt eine kontinuierliche oder gleitende Reihe dar. *H. nigratum* darf zugleich mit dieser Reihe betrachtet werden, weil es, aus *H. atratum* entstanden und auf *H. polymorphum* hinweisend, eine Parallelfarm zu *H. nigrescens* bildet.

Nur in geringerem Grade kontinuierlich ist die Reihe *H. alpinum-vulgatum*. Denn zwischen *H. alpinum* und *glandulosodontatum*, dem primären Bastard der Endglieder, kennen wir keine Uebergangsstufen — *H. eximium* berechtigt uns nicht zu einer diesbezüglichen Annahme —, dagegen wird die Reihe von *H. glandulosodontatum* bis *vulgatum* zu einer gleitenden.

Die Reihe *H. alpinum* (mit *tubulosum*) — *prenanthoides* zeigt folgendes Bild. Aus *H. alpinum* und *tubulosum* ist *H. polymorphum* als Mutation entstanden; die von *H. alpinum* abgeleiteten Charaktere treten besonders deutlich in der var. *Uechtritzianum*, die von *H. tubulosum* herrührenden in der var. *Fritzei* hervor. Zwischen *H. polymorphum* und *prenanthoides* schieben sich die primären Bastarde *H. rhiphaeum* und *bohemicum* ein, die beide $\pm$ zu *H. prenanthoides* hin goneoklin sind. *H. bohemicum* und *polymorphum* haben den sekundären Bastard *H. pedunculare* erzeugt. Dazu kommt, dass sich einige Formen von *H. polymorphum* var. *Fritzei* dem *H. pedunculare* nähern, also morphologisch als Uebergangsstufen aufzufassen sind. Demnach zeigt auch diese Reihe gleich der ersten sehr dichte Besetzung, aber sie ist nicht vollkommen kontinuierlich, da zwischen *H. prenanthoides* und *rhiphaeum* einerseits und zwischen *H. pedunculare* und *bohemicum* andererseits zwei freilich nur sehr geringe Lücken vorhanden sind. Der von Schube

angegebene Bastard *H. bohemicum* $\times$ *preanthoides* müsste, wenn er überhaupt existiert, dem *H. riphacum* sehr nahe stehen und zwischen diesem und *H. bohemicum* vermitteln.

Die Hauptarten *H. preanthoides* und *murorum* haben in *H. Wimmeri* einen zu *H. murorum* und in *H. albinum* einen zu *H. preanthoides* hin geneoklinen, primären Bastard gebildet. Die Reihe vervollständigt sich noch durch Einschlebung von *H. Pseud-Wimmeri* zwischen *H. Wimmeri* und *H. murorum*.

Die Reihe *H. preanthoides* — *vulgatum* weist schwache Besetzung auf. Nur *H. corconticum* und *asperulum* bilden die Zwischenglieder.

Die Reihe *H. preanthoides* — *caesium* enthält nur den primären Bastard *H. Engleri*.

Die jetzt noch übrigen Reihen sind abgeleitet. Sie kommen zustande zwischen *H. caesium* und *glandulosodontatum*, die den sekundären Bastard *H. intermedium* bilden, zwischen *H. bohemicum* und *Wimmeri*, die den sekundären Bastard *H. pseudalbinum*, zwischen *H. pseudalbinum* und *vulgatum*, die die sekundären *H. erythropodum* und *corruptum* hervorbringen. Die letzte Reihe ist vollständig kontinuierlich, weil *H. erythropodum* sich in der einen Varietät mehr dem *H. pseudalbinum*, in der andern mehr dem *H. vulgatum* nähert, und *H. corruptum* den Anschluss an *H. vulgatum* noch enger herstellt. Auch die vorige Reihe *H. bohemicum* — *Wimmeri* ist nahezu kontinuierlich, weil *H. pseudalbinum* variabel ist.

Endlich bildet *H. decipiens* den Ausgangspunkt für die primären Zwischenformen *H. dubiosum* und *H. pseudodecipiens* und das sekundäre *H. pseudeximium*, die die Verbindung mit *H. tubulosum*, *eximium* und *pedunculare* vermitteln.

Der Einblick in diese Tabelle lehrt deutlich, wie eng die verschiedenen Sippen sich zu einander gesellen. Für denjenigen, dem die Grundformen nicht fremd sind, wird dieses Schema vielleicht auch als geeignetes Mittel zur Bestimmung der Zwischenglieder dienen können.

Anatomischer Teil.

A. Anatomischer Bau.

Der Bau des Hieracienstengels ist am besten auf Querschnitten zu studieren. Diese zeigen allgemein folgendes Bild.

Ein das Innere des Stengels einnehmender, nur bei *H. nigritum* auf lysigenem Wege zum völligen Schwinden gebrachtes Mark aus grossen, dünnwandigen, rundlichen Zellen mit Interzellularräumen wird von einem geschlossenen Ringe mechanischen Gewebes umgeben. Die collateralen Gefässbündel lehnen sich an diesen Ring an. Weitere Komplexe mechanischen Gewebes liegen an der Aussenseite jedes Bündels. Diese verschmelzen mit dem mechanischen Ringe zu einer Zone, sodass die Gefässbündel von mechanischem Gewebe ringsum eingeschlossen sind. Markständige Gefässbündel sind ebensowenig vorhanden wie rindenständige¹⁾. Weder epidermaler noch subepidermaler Kork wurde in zusammenhängenden Schichten beobachtet, dagegen war vereinzelt subepidermaler Kork von 2—3 Schichten Dicke, allem Anscheine nach Wundkork, in nur wenig ausgedehnten Lagern bemerkbar.

Die mechanische Scheide besteht aus mehr oder weniger verdickten, lückenlos aneinander stossenden und mit deutlich kommunizierenden, unverzweigten Tüpfeln versehenen Zellen und ist im allgemeinen bei *H. alpinum* am schwächsten, bei *H. prenanthoides* am stärksten ausgebildet. Sowohl die Zwischenformen dieser beiden Hauptarten als auch die übrigen Hauptarten besitzen ziemlich kräftige, mechanische Scheiden, die in Bezug auf Stärke der Ausbildung ungefähr die Mitte zwischen *H. alpinum* und *prenanthoides* halten. Dazu kommt, dass die Stärke der Ausbildung sehr variabel ist. Es gibt von *H. alpinum* Formen, die stärkere Scheiden als gewöhnlich haben, ebenso kommen bei *H. prenanthoides* auch schwächere Scheiden vor.

¹⁾ vergl. Solereder, Systematische Anatomie der Dikotyledonen, 1899, p. 527.

Ebenso variabel ist die Zahl der Rindenschichten. Im allgemeinen ist sie bei *H. alpinum* am grössten, im Mittel etwa 9 -10, bei den anderen Hauptarten dagegen nur etwa 7 -8. Gleichwohl variiert *H. alpinum* in Bezug auf jene Zahl von 5 oder 6 bis 13, und ähnliche Verhältnisse zeigen auch die andern Sippen.

Das öfter sehr schön ausgebildete Plattencollenchym der Tangentialwände der äusseren Rindenzellen ist in seiner Stärke sehr wechselnd, wenn auch im allgemeinen bei *H. vulgatum* und *chlorocephalum* am stärksten entwickelt. Fast immer ist die innere Tangentialwand der Epidermiszellen verdickt. Das Collenchym tieferer Schichten fehlt bei manchen Individuen oft ganz, erstreckt sich aber bei andern derselben Sippe in wohlausgebildetem Zustande nicht selten bis über 6 Schichten. Nur das ist für die Entwicklung des Collenchyms bei allen Sippen konstant, dass es seine relativ schönste und reichste Ausbildung stets an den den Gefässbündeln vorgelagerten Rindenschichten aufweist, von aussen nach innen allmählich abnehmend. Die Stärke des Collenchyms bedingt übrigens die äusserliche Streifung des Stengels.

Die Epidermiszellen, die collenchymatisch ausgebildeten Rindenzellen und die der mechanischen Scheide anliegende Schicht sind chlorophyllfrei, die andern Rindenschichten führen dagegen Chlorophyll.

Die Gefässbündel sind bei allen Sippen gleichartig gebaut, sowohl in Bezug auf die Ausbildung der Elemente als in Bezug auf deren Lage.

Die für die Cichorieen charakteristischen, gegliederten Milchröhren begleiten die Gefässbündel an ihrer Aussenseite, sind aber auch im Phloem zuweilen anzutreffen¹⁾. Calciumoxalat, das manchen Kompositen zukommt, wurde nicht beobachtet, dagegen Inulin, das sich in Sphärokrystallen reichlich abschied.

Der Bau der Blätter ist überall der gleiche. Das einreihige Pallissadenparenchym der Blattoberseite wird auf

¹⁾ vergl. Vuillemin, Tige des Composées, 1884, p. 98 u. 128.

der Unterseite durch das Schwammparenchym ersetzt. Die Form der Epidermiszellen ist sehr variabel. Eine tief ausgebuchtete Gestalt herrscht bei weitem vor, aber an über den Blattrippen liegenden Zellen verliert sich die Buchtung, indem sich die ganze Zelle zu länglicher Form streckt. Bei *H. alpinum* finden sich sehr wenig oder garnicht ausgebuchtete Zellen zuweilen auch an allen andern Theilen der Blattoberfläche, aber eben durchaus nicht immer. Collenchym kommt nur in sehr wechselnder, meist geringer Stärke als innere Umkleidung der Blattstiele und Blattrippen vor. Die Spaltöffnungen zeigen einen bei allen Sippen übereinstimmenden Bau und finden sich auf der Blattunterseite zahlreicher als auf der Blattoberseite. Jede Spaltöffnung wird gewöhnlich von 4, zuweilen auch von 3 oder 5 Epidermiszellen umgeben. Der Spaltöffnungsapparat, kaum unter die Ebene der übrigen Epidermiszellen eingesenkt, zeigt im Querschnitt ein normales Bild. Die Milchröhren begleiten die Gefässbündel, treten aber zuweilen in das Mesophyll ein.

Die Ausbildung der Haare wurde bereits früher besprochen; hier bedarf es noch einer Erweiterung, die erst die mikroskopische Betrachtung ergibt. Die Haare der Hieracien sind sämtlich mehrzellig. Die Borsten oder Zottenhaare bestehen aus in der Längsrichtung des Haares gestreckten, verdickten Zellen, deren oberflächliche an ihrem, dem Haargrunde abgekehrten Ende mit einer schwach schräg gestellten Spitze hervorragen. Die Drüsen- oder Köpfchenhaare bauen sich aus weniger gestreckten, dünnwandigen Zellen auf. Der Stiel setzt sich je nach der Grösse des Gebildes aus sehr zahlreichen oder nur ziemlich wenigen die Köpfchen selbst aus nur etwa 3—6 Zellen zusammen. Die Flockenhaare sind unregelmässig gebaut und machen in der Einzelbetrachtung bald einen flaumigen, bald einen sternartigen, in der Gesamtbetrachtung bei zahlreicher Anwesenheit einen filzigen Eindruck. Die Flaumhaare darf man vielleicht als zuweilen verzweigte, einreihige Borstenhaare mit dünnen Zellwänden betrachten, die Sternhaare weisen deutlich einen Stiel aus gewöhnlich 2 oder 3 proto-

plasmareichen Zellen und einem oberen ganz unregelmässig verzweigten Teil auf. Dieser ist einzellig und sehr protoplasmaarm, dünnwandig, aber mit besonderen Verdickungsleisten versehen, die bald der Längserstreckung der Auszweigungen folgen, bald quer zu ihnen verlaufen.

Die mikroskopische Betrachtung des Pollens ergibt für alle Sippen das gleiche Bild, einen linsenförmigen, mit kleinen Haftstacheln reichlich besetzten Körper. Die Keimung von Pollen in Nährlösungen lieferte nur sehr unbefriedigende Resultate, weil nur ein überaus geringer Prozentsatz, meist noch nicht 5 %, der Pollenkörner überhaupt zum Keimen zu bringen war, und weil die in möglichst gleichen Stadien gesammelten Pollenkörner verschiedener Individuen derselben Art sich nicht einmal in Bezug auf diese geringe Zahl alle gleich verhielten. Wasser allein veranlasste den Pollen niemals zur Keimung, ebensowenig wässrige Rohrzuckerlösung. Dagegen trat der geringe Erfolg bei konzentrierter Traubenzuckerlösung ein.

Nach diesen Ergebnissen erscheint es sehr auffällig, dass in der Gattung *Hieracium* doch so viele Bastarde zur Ausbildung gelangen. Allein die künstlich angestellten Keimungsversuche sind noch kein Beweis dafür, dass der *Hieracien*-pollen tatsächlich keimungsunfähig ist: denn die Möglichkeit, dass mit den gebotenen Nährlösungen die Bedingungen, unter denen er keimt, nicht oder nur schlecht getroffen werden, ist durchaus nicht von der Hand zu weisen.

B. Inwieweit lassen sich die phylogenetischen Schlussfolgerungen durch die Anatomie stützen?

Können die mechanischen Gewebe, die sich ja in erster Linie variabel zeigen, nicht einmal zur Unterscheidung der einzelnen Hauptarten dienen, so ist es klar, dass goneokline Bastarde von vornherein unerkennbar sind, und dass intermediäre Bastarde oder andere Mittelformen theoretisch nur dann einen Anhalt bieten können, wenn sie zwischen dem relativ extremen *H. alpinum* und anderen Hauptarten stehen. Praktisch ist aber auch hier kein Erfolg zu verzeichnen,

weil solche Mittelformen anatomisch sich nicht von den andern Hauptarten unterscheiden lassen. Mittelformen zwischen diesen letzten unter sich aber gleichen einander sämtlich.

Uebrigens ist die verschiedene Ausbildung der mechanischen Gewebe durch die äusseren Verhältnisse der Pflanzen ohne weiteres erklärbar. Ein *Hieracium* von starkem Wuchse bedarf zu seiner Festigung naturgemäss stärkerer mechanischer Aussteifung als eines von schwachem Habitus. Auf diese Weise erklärt sich die Verschiedenheit von *H. prenanthoides* und *alpinum*. *H. alpinum* ist fast immer die in Bezug auf ihren Wuchs relativ niedrigste der besprochenen Sippen, hat zudem keine wohlausgebildeten Stengelblätter und wird daher auf Biegungsfestigkeit weniger als *H. prenanthoides* beansprucht, obwohl es gerade an den offensten Stellen anzutreffen ist. Bei starkem Winde biegen die Stengel um. *H. prenanthoides* würde, wenn es nur schwache mechanische Gewebe besässe, in starkem Winde brechen.

Die Anatomie des Blattes leistet den phylogenetischen Hypothesen ebensowenig Hülfe wie die des Stengels; das Gleiche gilt für die Gestalt des Pollens.

Die Behaarung wurde im morphologischen Teile mehrfach berücksichtigt, weil die Verteilung der einzelnen Trichomkategorien bei verschiedenen Sippen eine verschiedene ist. Die anatomische Ausbildung der einzelnen Haare innerhalb der Kategorien aber erweist sich als konstant. Abgesehen davon, dass das eine Zotten- oder Drüsenhaar grösser als das andere ist, infolgedessen auch einer grösseren Anzahl Zellen zu seinem Aufbau bedarf, sind Unterschiede nicht zu bemerken. Die unregelmässig, oft vielfach verzweigte Endzelle der Sternhaare ist in ihrer Gestalt derartig variabel, dass kaum zwei völlig sich gleichende Sternhaare vorkommen dürften.

Wir sehen aus dem vorhergehenden deutlich, dass die Anatomie der auf morphologischem Wege gewonnenen Ansicht keine positive Hilfe gewährt. Nur das darf man mit Sicherheit sagen, dass sie ihr nicht widerspricht.

Systematischer Teil.

A. Die Bedeutung der Stylosität der Blüten.

Die Bedeutung der Stylosität der Blüten wurde in der Einleitung nur kurz erwähnt.

Die Stylosität tritt in 2 verschiedenen Ausbildungsarten auf. Die eine beruht darauf, dass die Ligulae stark verkümmern, indem sie unter gleichzeitiger Verkürzung ganz unregelmässig werden und umbiegen; die andere besteht darin, dass die Ligulae völlig verschwinden und so eine regelmässige Blumenkronenhöhle mit 5 Zipfeln zustande kommt. Die regelmässigen stylösen Blüten kommen bei den um *H. alpinum* sich scharenden Sippen vor, die zuerst genannte Ausbildungsart nur bei *H. riphacum*. Sie ist als Mittelstufe zwischen den Zungenblüten und den typisch stylösen Röhrenblüten aufzufassen.

Somit stellen die stylösen Blüten eine vorgeschrittene Entwicklungsstufe dar, die sich in der Ausbildung dem ursprünglichen, regelmässigen Bau nähert, von dem die Kompositenblüten ganz allgemein abgeleitet werden müssen.

Man darf nicht annehmen, dass das Hervorragen der Griffel durch deren grössere Länge bedingt ist. Messungen der Längenverhältnisse an randständigen Blüten ergaben im Mittel:

Länge	<i>H. riphacum</i>		<i>H. polymorphum</i>	
	Zungenblüten	Stylöse Blüten	Zungenblüten	Stylöse Blüten
der Krone	1,3 cm	1,0 cm	1,6—1,7 cm	0,7—0,8 cm
des Griffels	1,1 cm	0,9 cm	1,5—1,6 cm	1,0—1,2 cm
der Röhre	0,4 cm	0,4 cm	0,4—0,6 cm	0,6—0,7 cm

Man ersieht aus dieser Angabe, dass es bei den *Alpinis* (*H. polymorphum*) lediglich die Verkürzung der Krone ist, die die Griffel so weit hervorragen lässt, bei *H. rhipaeum* das Umbiegen der verkümmerten *Ligulae*; denn deren Verkürzung allein reicht nicht aus.

Rein äusserliche Faktoren, wie klimatische Verhältnisse, Lage des Standortes u. s. w., dürften die Ausbildung der Stylosität kaum bedingen, da es noch nicht gelungen ist, stylöse Hieracienblüten in der Kultur künstlich zu erziehen, und da stylöse Formen durch Jahrzehnte lang in der Kultur konstant bleiben.

Sobald die Narben über die Köpfchen weit hinausragen gelangt das von einer andern Blüte kommende Insekt in die Lage, den fremden Pollen auf den Narben abzuladen. Die Erleichterung der Fremdbestäubung ist also eine Folge der Stylosität. Man wird daher, von der Wirkung auf die Ursache schliessend, dazu geführt, die Ursache der Stylosität in dem Bedürfnis der Pflanze nach Fremdbestäubung zu erblicken. Mit der Begünstigung der Fremdbestäubung wird natürlich auch die Bastardbildung gefördert.

Andererseits darf man als Ursache der Stylosität einen Uebergang zur ♀ Eingeschlechtigkeit der Blüte annehmen; denn obwohl die Narbenpapillen und der stets vorhandene Pollen stylöser Blüten in Bezug auf Grösse und Form keinerlei Unterschiede gegen die nicht stylösen Individuen zeigen, und der Pollen sich bei den Keimungsversuchen gleich verhält, so sind doch die Staubblätter der stylösen Formen kleiner als die der nicht stylösen, somit die Zahl der Pollenkörner geringer; und das bedeutet vielleicht ebenso den Anfang eines Ueberganges zur Eingeschlechtigkeit wie die Reduktion des Schauapparates, der nicht mehr sehr geeignet ist, bestäubende Insekten anzulocken.

Diese Annahme dürfte mehr Wahrscheinlichkeit für sich haben als die erste, und man darf deshalb in der Anpassung an die Fremdbestäubung vielleicht in erster Linie nur eine den Uebergang zur Eingeschlechtigkeit begleitende Erscheinung erblicken, die, trotzdem sie Begleiterscheinung

ist, doch ihre Folge, die zahlreichen Bastardbildungen, nach sich zieht.

Die stylösen Formen der Hieracien sind durchaus konstant, insofern als die in Kultur gebrachten Stöcke ihre stylösen Blüten niemals verlieren. Dazu kommt, dass manche Sippen fast ausnahmslos stylös gefunden werden, wie *H. rhiphaeum*, während für andere Sippen die Stylosität nur eine häufigere Erscheinung ist, so z. B. für *H. polymorphum*. Für *H. rhiphaeum* darf somit die Stylosität als ein systematisches Merkmal von hoher Bedeutung aufgefasst werden, und auch für die Wiedererkennung des *H. polymorphum* erweist sie sich von grösserer Wichtigkeit.

Stylöse Blüten treten nun auch bei anderen Hieracien auf, doch nur vereinzelt. So beobachtete Professor Pax bei *H. caesium*¹⁾ und *albinum*²⁾ stylöse Blüten. Da jedoch deren Häufigkeit nirgends so gross ist wie bei den um *H. alpinum* sich scharenden Sippen, so wird man immerhin für eine Mittelform, bei der die Stylosität häufiger in die Erscheinung tritt, zunächst die Möglichkeit einer Ableitung von *H. alpinum* oder Verwandten zu erwägen haben, wie ja auch *H. polymorphum* ohne Zweifel von *H. alpinum* ausgeht.

B. Systematische Aufzählung der besprochenen Sippen.

In der folgenden Darstellung bedeutet ein * eine Hauptart von höherem phylogenetischen Alter, eine ° eine durch Mutation entstandene Sippe, ein > eine durch Bastardbildung hervorgegangene Sippe höheren Alters, die als Art zu bewerten ist; > > bezeichnen einen relativ jungen und seltenen Bastard; ein † eine noch nicht zur Art gewordene Mutation oder Variation.

I. Sectio Alpina Fries³⁾.

Subsectio 1. Subfoliosa G. Schnd.⁴⁾

¹⁾ vergl. Fick, Flora von Schlesien, 1881, p. 274.

²⁾ vergl. R. W. B. XII, 1892, 3 u. 4 p. 67.

³⁾ Epicrisis gen. Hieraciorum, p. 6 u. 42.

⁴⁾ Ö. P. Z. XXXVI, 1836, p. 21.

1. * *H. alpinum* L.¹⁾

α. var. *genuinum*

β. var. *melanocephalum* Tsch.

2. * *H. tubulosum* Tsch.

3. + *H. eximium* Baekh. var. *calenduliflorum*
Baekh.

Subsectio 2. **Follosa** G. Schnd.²⁾

4. ° *H. polymorphum* G. Schnd.

α. var. *Fritzei* F. Schultz

β. var. *Uechtritzianum* G. Schnd. (emend.)

Subsectio 3. **Malltlosa** G. Schnd.³⁾

5. + *H. decipiens* Tsch.

6. ×× *H. dubiosum* G. Schnd.

7. ×× *H. pseudodecipiens* G. Schnd.

8. ×× *H. pseudeximium* G. Schnd.

9. ×× *H. Sagorskii* G. Schnd.

II. Sectio **Subpulmonarea** G. Schnd.⁴⁾

10. ×× *H. nigrescens* Willd.

11. ×× *H. glandulosodentatum* Uechtr.

12. × *H. atratum* Fries

13. ° *H. nigratum* Uechtr.

Der Typus dieser Sektion wird durch *H. nigrescens* und *glandulosodentatum* gebildet. *H. atratum* stellt bereits eine Uebergangsstufe zur Sect. *Vulgata* dar. Die Kopfhüllen des *H. atratum* sind in Bezug auf Farbe, Gestalt und Grösse denen von *H. murorum* weniger ähnlich als denen von *H. nigrescens* und *glandulosodentatum*, deshalb wird *H. atratum* hier zu den *Subpulmonarea* gezogen. Dasselbe geschieht mit *H. nigratum*, weil es nach den früheren Erörterungen eine aus *H. atratum* entstandene, zur Parallelförmigkeit von *H. nigrescens* gewordene Sippe ist.

¹⁾ Da Litteratur und Synonymik bereits im morphologischen Teile Berücksichtigung gefunden haben, darf hier auf diese Angaben verzichtet werden.

²⁾ Ö. B. Z. XXXVI, 1886, p. 22.

³⁾ Ö. B. Z. XXXVII, 1887, p. 276.

⁴⁾ Ö. B. Z. XXXVI, 1886, p. 24.

III. Sectio **Pseudoprenanthoidea** G. Schnd.¹⁾

14. × *H. pedunculare* Tsch.

15. × *H. bohemicum* Fries

16. × *H. rhiphaeum* Uechtr.

H. rhiphaeum, das Uechtritz zu den *Prenanthoidea*, Schneider aber mit grösserem Rechte zu den *Subprenanthoidea* Gremli zieht, ist hier den *Pseudoprenanthoidea* G. Schnd. zugewiesen worden, weil die morphologische Analyse die nächsten Verwandten des *H. rhiphaeum* in *H. bohemicum* und *prenanthoides* feststellte.

IV. Sectio **Vulgata** Fries²⁾

17. * *H. murorum* L.

18. ×× *H. Pseudo-Wimmeri* G. Schnd.

19. * *H. vulgatum* Fries.

20. ×× *H. corruptum* G. Schnd.

21. ×× *H. intermedium* G. Schnd.

V. Sectio **Caesia** G. Schnd.³⁾

22. * *H. caesium* Fries

VI. Sectio **Prenanthoidea** Fries⁴⁾

23. * *H. prenanthoides* Vill.

VII. Sectio **Alpestris** Fries⁵⁾

24. * *H. chlorocephalum* Wimm.

25. × *H. Wimmeri* Uechtr.

26. ×× *H. albinum* Fries

27. ×× *H. pseudalbinum* Uechtr.

28. ×× *H. erythropodum* Uechtr.

α. var. *genuinum*

β. var. *subintegrifolium* G. Schnd.

29. ×× *H. coreonticum* K. Knaf

30. ×× *H. asperulum* Freyn

¹⁾ Ö. B. Z. XXXVI, 1886, p. 25.

²⁾ *Epicrisis* gen. *Hieraciorum*, p. 7 u. 89.

³⁾ Deutsche Botanische Monatsschrift, 1888, p. 119.

⁴⁾ *Epicrisis* gen. *Hieraciorum*, p. 7 u. 118.

⁵⁾ *Epicrisis* gen. *Hieraciorum*, p. 7 u. 102.

31. $\times\times$ H. Engleri Uechtr.

32. H. Purkyněi Čelak. (Vgl. p. 40).

Uechtritz unterschied in der Sect. Alpestria zwei Subsektionen, die Eualpestria und Alpestria spuria. Er rechnete zu den Eualpestria das H. chlorocephalum, das in der Sectio überhaupt einen ziemlich isolierten Platz einnimmt, und zu den Alpestria spuria gerade die Sippen, die der Sectio Alpestria im Sinne von Fries entsprechen.

C. Kurzgefasster Schlüssel zum Bestimmen der besprochenen Sippen.

Um die Bestimmung der besprochenen Sippen zu erleichtern, mag folgender Schlüssel dienen, in welchem die schwer erkennbaren H. pseudodecipiens, dubiosum, pseudeximium, Sagorskii, Pseudo-Wimmeri, corruptum und intermedium, sowie das mir unbekannte H. Purkyněi unberücksichtigt bleiben.

Wesentlich für das Bestimmen ist die Grösse der Köpfe. Man kann ziemlich deutlich 4 Stufen der Kopfgrösse unterscheiden ¹⁾ — von der Ausbildung der Mikrocephalie wird auch hier abgesehen — und auf diese, von der Länge der Hüllschuppen abhängig gemachte Kopfgrösse werden die Hauptabteilungen der Tabelle begründet. Freilich kommen bei allen Sippen zuweilen besonders robuste und Zwergindividuen zur Ausbildung; in solchen Fällen muss eben die relative Kopfgrösse ausschlaggebend sein. Andere Merkmale, wie Behaarung, Erhaltung der Grundblätter und ähnliches sind wegen mangelnder Konstanz nicht geeignet, den Hauptabteilungen der Tabelle als Vorlage zu dienen, müssen dagegen in den Unterabteilungen Berücksichtigung finden; und die Gestalt der Blätter würde die Hauptabteilungen zu umfangreich gestalten.

¹⁾ H. polymorphum, decipiens u. glandulosodentatum sind wegen des Wechsels der Kopfgrösse in der folgenden Tabelle je zweimal berücksichtigt.

Stengel meist blattlos oder mit Brakteen besetzt	Hüll- schuppen in erster Linie zottig behaart	Blätter nicht stengel- umfassend	Blätter ungezähnt oder nur sehr schwach gezähnt	H. alpinum: Grundblätter zur Blütezeit stets vor- handen, einköpfig, Zungenblüten vor- herrschend. var. genulum: grüneiche Kopfzellen. var. melanocephalum: schwärzliche Kopfzellen.
Stengel deutlich beblättert	Hüll- schuppen mit beige- meigten grösseren Drüsen	Blätter halb- stengel- umfassend	Blätter ungezähnt oder nur sehr schwach gezähnt	H. tubulosum: Grundbl. z. Bl. vorhanden od. teil- weise vertrocknet, Stengel (1—) 2—3 (—5) blättrig, vorherrschend einköpfig, tubulöse, selten stylöse, ausnahmsweise Zungenbl. H. eximium var. calenduliflorum: Grundbl. z. Bl. meist vorhanden, Stengel 3—5 (—8) blättrig, vorherrschend einköpfig, Kopf- schuppen oft reichlich sternhaarig, Zungenbl. vorherrschend, stylöse selten. H. decipiens: Grundbl. zur Bl. bald erhalten, bald vertrocknet, breit spatelig, Stgl. 2—3 blättrig, 1—3 köpfig, Zungenbl. H. polymorphum var. uechtritizianum, robuste Form: Grundbl. z. Bl. meist vorhanden, Stgl. (3—) 4—5 (—6) blättrig, einköpfig, Zungenbl. u. stylöse Blüten.
Verhältnismässig starke Stengel, läng- lich lanzettliche oder spatelige Form der Blätter, + geflügelte Blattsiele, reiche Zottenhaarbe- kleidung.	Hüll- schuppen mit beige- meigten grösseren Drüsen	Blätter halb- stengel- umfassend	Blätter ungezähnt oder nur sehr schwach gezähnt	H. alpinum: Grundblätter zur Blütezeit stets vor- handen, einköpfig, Zungenblüten vor- herrschend. var. genulum: grüneiche Kopfzellen. var. melanocephalum: schwärzliche Kopfzellen.

B. Kopfhüllen- länge 13—14 mm.	Grundblätter zur Blütezeit sämtlich er- teilweise er- halten	Deutlich ab- gesetzte, wenig oder garnicht ge- flügelte Blatt- stiele	Stengel 1—2 blättrig od. nur mit Brak- teen besetzt	H. glandulosodentatum: Blätter breit od. schmal eiförmig, reich u. spitz drüsenzählig mit oft lang ausgezogener Blattspitze, Zungenbl. H. nigrescens: Blätter mit stumpfer Spitze, Grund- bl. rundlich u. dann wenig drüsen- zählig oder schmal und dann meist stark drüsenzählig, Stengelbl. kürzer gestielt od. ungestielt, schwarze Köpfe, Zungenblüt.
Ein- oder Mehr- köpfigkeit, Abnahme der Zottenhaarbe- kleidung, Zunahme der Drüsenhaarbe- kleidung, bei Ver- zweigung grenzloser Kopfstand.	Grundblätter zur Blütezeit bald ver- trocknet	Blätter lan- zettlich oder spatelig mit deutlich ge- flügelten Blattstielen	Stengel 2—3 blättrig Stengel (2—) 3—4(—6) blättrig	H. declpens: Blätter wenig od. gar nicht gezähnt, Zungenblüten. H. polymorphum: Blätter zuweilen schwach halb- stengelumfassend, wenig od. gar nicht gezähnt. var. Fritzel: Pflanze steif, 1—10 köpfig, vor- herrschend stylöse, seltner Zungenblüten. var. Uechtritzianum: Pflanze schlank, fast immer einköpfig, Zungen- u. stylöse Blüten.
	Grundblätter zur Blütezeit fast stets ver- trocknet	Blätter längl., m. breitem, ab- grund, Grün- de sitzend	Stengel 4—6 blättrig	H. pedunculare: Blätter schwach halbstengelum- fassend, schwach gezähnt, Zungen blüten.

C. Kopfhüllen- länge 12 mm. Oft kräftige Pflanzen, Vorherrschen der Mehrköpfigkeit, Zot- ten- und Drüsenbaar- bekleidung, Stern- haare nicht selten bis auf die Kopf- schuppen reichend.	Grund- blätter zur Blütezeit wenig- stens teil- weise er- halten, breit ei- förmig bis breit lan- zettlich	Blätter nicht stengel- umfassend	Kopfhül- len zotten- und reich- lich drü- senhaarig	Kopfstand steif, gabelig, öfters über- gipfelig	H. glandulosodentatum: Blätter reichlich spitz drüsen- zählig, allmählich in den Stiel verschmälert, Stgl. 1—2 blättrig, Zungenbl. H. atratum: Grundbl. am Grunde meist eingebuchtet ge- zähnt, die äusseren, breiten plötzlich in den Stiel verschmälert, die inneren, schmalen all- mählich, Stengel blattlos od. 1—2 blättrig, Stengelbl. kurz gestielt od. ungestielt, Kopf- hüllen schwarz, Zungenblüten. H. nigritum: Blätter, besonders Stglbl., fast rhombisch mit ausgezogener Spitze, wenig, aber deutlich ge- zähnt, Stengel hohl, (1—)2—3(—8) blättrig, Kopfstand oft schon unter der Stengelmitte beginnend, Zungenblüten. H. chlorocephalum: Blätter blassgrün, drüsenzählig, Stengel 3—5 blättrig, Stglbl. ungestielt, manch- mal kaum halbumfassend. Köpfe am Grunde gestutzt, innere Hüllschuppen breit hell be- raudet, Zungenblüten. H. Engleri: Blätter kaum gezähnt, Grundbl. mit breit- geflügelm Stiele, Stengel 2—3 blättrig, Stglbl. mit breit geflügeltem Stiele und feiner Spitze, Hüllschuppen schon vor dem Aufblühen weit über die Köpfchen hinausstehend, Zungenbl. H. bohemleum: Stgl. 4—8 blättrig, Blätter in geringem Winkel vom Stengel abstehend, gezähnt, untere schwach gefügelartig verengt mit breit geflügelm Stiele, Köpfe ober eiförmig sitzend, Kopfhüllen dunkel, Zungenbl. H. riphaeum: Stengel (4—)5—6(—7) blättrig, Blätter in grossen Winkel vom Stengel abstehend, ent- fernt inseriert, undeutlich gezähnt, untere breit lanzettlich mit gestutztem, obere eiförmig mit abgerundetem Grunde, bei weitem vor- herrschend stiellose Blüten, Zungenbl. sehr selten

Nicht stengel- umfassen - de Blätter	Einige Grund- blätter stets bis zur Blüte- zeit er- halten	Halb- stengel- umfassen - de Blätter	D. Kopfhüllen- länge 9—10 mm.	Schlanke, oft ziem- lich hohe Pflanzen mit verhältnismässig dünnen Stengeln, Mehrköpfigkeit vor- herrschend, reiche Drüsen- u. arme Zottenhaarbe- kleidung (Ausnahme H. caesium), Stern- haare oft bis auf die Kopfschuppen reichend.	Grund- blätter zur Blütezeit bald er- halten, bald ver- trocknet	Grundbl. z. Blütezeit nie Erhalt.	Vorherr- schend Drüsen- haarbe- kleidung	H. murorum: Grundblätter in Rosette bis zur Blütezeit erhalten, breit, am Grunde abgerundet od. gestutzt, grob gezähnt, Stgl. blattlos od. 1—2 blättrig, Kopfstand rispig ebensträussig, Zungenbl. H. vulgatum: Grundbl. bis z. Blütezeit meist, aber nicht immer erhalten, Stgl. 2—3(—7) blättrig, Blätter breitlich od. schmal, spitz u. spitz gezähnt, Kopfstand locker doldenrispig, Zungenblüten. H. caesium: Blätter papierartig, fast ganzrandig, Grundbl. bis z. Blütezeit erhalten, Stgl. 1—2 blättrig, Kopfstand gabelig rispig, Zungenblüten vorherrschend, stylöse selten. H. alpinum: Blätter gezähnt, Grundbl. plötzlich in den Stiel über- gehend, Stg. (2—)3(—4) blättrig, Stglbl. länglich eiförmig, unteres deutlich gestielt, grösser als die Grundblätter, obere mit breitgefingelem, kurzem Stiele, fast in rechtem Winkel vom Stengel abstechend. Zungenbl. vorherrschend, stylöse selten. H. Wimmeri: Blätter meist am Grunde gebuchtet gezähnt, Stgl. (1—) 2—3(—4) blättrig, unterstes Stglbl. kurz gestielt, die andern sitzend, Kopfstand grenzlos, Kopfstiele sehr dünn u. hin und her gebogen, Zungenblüten. H. erythropodum: Grundbl. sich fast aufrecht vom Boden erhebend, lang gestielt, untere Stengelteile stets rot, Zungenbl. var. genulinum: 3 und mehr Stengelbl., gleichmässig scharf gezähnt. var. subintegrifolium: 2 Stengelbl., gleichmässig schwach u. nicht scharf gezähnt. H. pseudalpinum: Blätter elliptisch, sehr schwach gezähnt, Stgl. (3—) 4—5(—8) blättrig, Stengelbl. in geringem Winkel vom Stgl. abstechend, unterstes nicht grösser als die Grundbl., lang ge- stielt, obere fast sitzend mit breitgefingelt. Grunde, Zungenbl. H. coreontium: Blätter breit lanzettlich, z. T. etwas geigenförmig verengt, Stgl. (3—)4—5(—7) blättrig, untere Stglbl. mit nicht nach abwärts gebogenen Ohren, obere am Grunde gestutzt, Zungenblüten. H. asperulum: Blätter schmal lanzettlich, kaum oder garnicht geigen- förmig verengt, Stgl. (4—)5—6(—8) blättrig, Stengelbl. ohne Blattohren, spitz, Zungenblüten. H. prenanthoides: Stgl. vielblättrig, Blätter umfassend, oft mit Blatt- ohren, Kopfstand abgesetzt, vielköpfig, Zungenblüten.
---	--	---	----------------------------------	---	--	---	--	--

D. Versuch einer phylogenetischen Entwicklung der Alpina und Alpestria im Riesengebirge.

Die Eiszeiten vernichteten die tertiäre Flora des Riesengebirges. Erst als die Gletscher wieder zurückwichen, folgte die Neubesiedlung der Sudeten durch eine Flora, die durch nordische, alpine und karpatische Typen bereichert war. Damals wanderten auch Vertreter der Gattung *Hieracium* ins Gebirge ein.

Ob die Gattung schon zur Tertiärzeit existierte, ist noch nicht sicher erwiesen, aber im hohen Maasse wahrscheinlich, weil mehrere Gattungen und sogar Arten aus dem Tertiär in fast oder gänzlich unveränderter Form auf die Jetztzeit übergegangen sind, wie z. B. *Acer Monspessulanum*¹⁾, und weil Compositae, die der Gattung *Hieracium* sehr nahe stehen, aus dem Tertiär, z. B. *Hieracites Salycorum* Sap.²⁾, *Bidens tripartitus*, *Pieris hieracioides*³⁾, und aus den Interglazialzeiten, z. B. *Taraxacum officinale*, *Tussilago prisca*³⁾, nachgewiesen sind.

H. murorum ist eine in der heutigen Flora überaus häufige und weit verbreitete Sippe: man darf deshalb annehmen, dass gegen das Ende des Diluviums bereits eine Art existierte, die dem heutigen *H. murorum* sehr nahe stand oder mit ihm identisch war. Dem *H. murorum* nahe verwandt ist *H. vulgatum*, und es ist nicht ausgeschlossen, dass dieses erst nachträglich aus *H. murorum* sich heraus differenziert hat. *H. murorum* besitzt eine kürzere Vegetationsperiode als *H. vulgatum*: die Pflanzen nun, die sich an ein kälteres Klima angepasst haben, sind sämtlich auf kurze Vegetationsperioden angewiesen. Da nun *H. murorum* sich schnell, *H. vulgatum* sich viel langsamer entwickelt, so liegt die oben ausgesprochene Vermutung, dass *H. murorum* beim Zurück-

¹⁾ F. Pax: *Aceraceae* in Englers Pflanzenreich, 1902, p. 65.

²⁾ vergl. Nägeli u. Peter: *Die Hieracien Mitteleuropas*, 1885, p. 65/66.

³⁾ C. A. Weber: „Versuch eines Ueberblickes über die Vegetation der Diluvialzeit“ in *Naturwissenschaftl. Wochenschrift*, 1900, p. 28.

weichen des Eises bereits bestanden, *H. vulgatum* aber erst später aus *H. murorum* entstanden sei, nicht allzufern.

H. alpinum, das, der Höhenlage seiner Standorte entsprechend, sich gleichfalls in kurzer Vegetationsperiode entwickelt, ist eine Sippe, die wahrscheinlich dem Norden Europas ihren Ursprung verdankt, vielleicht aber schon vor den Eiszeiten in den Gebirgen Europas ansässig war. Mit *H. prenanthoides* verhält es sich wahrscheinlich ähnlich, aber sein Habitus, seine Blütezeit und seine heutigen Standorte lassen auf das Bevorzugen eines etwas wärmeren Klimas schliessen, als *H. alpinum* es liebt.

Die allgemeine Verbreitung in fast allen europäischen Gebirgen ist es in erster Linie, die das Alter der genannten Sippen wahrscheinlich macht. Anders verhält es sich mit den Sippen, die in dieser Arbeit als Zwischenformen behandelt wurden.


Nur wenige von ihnen kommen ausserhalb des Riesengebirges vor. Wenn man aber anzunehmen geneigt ist, dass solche Sippen postdiluviale Einwanderer aus andern Gebieten seien, so ist nicht einzusehen, weshalb sie nicht auch in andere Gebirge eingewandert sein sollten. Man wird also unmittelbar zu der Annahme geführt, dass die dem Riesengebirge allein zukommenden Sippen, z. B. *H. bohemicum*, *pedunculare*, *riphaeum* u. a., dort auch ihr Entstehungsgebiet haben, also endemisch sind.

Die einen der Zwischenformen sind durch Variation oder Mutation entstanden, die andern durch Bastardbildung. Nicht immer die gleichen, aber ähnliche Variationen der Hauptarten finden sich auch mehrfach in anderen Gebirgen, z. B. den Alpen, Karpaten und dem skandinavischen Hochlande; die Bastarde aber spielen eine besonders hervorragende Rolle im Riesengebirge, weil die ungeheure Individuenzahl ihrer Entstehung günstig war.

Die eine Kategorie der Bastarde umfasst solche, deren Entstehung ziemlich weit zurückliegt, also wahrscheinlich bald nach der Besitzergreifung des Gebirges durch die Hieracienflora datiert, z. B. *H. bohemicum*, *Wimmeri*, *atratum*,

die andere Kategorie solche, die nicht genügend häufig sind, als dass sie als alte Sippen angesprochen werden dürfen, z. B. *H. albinum*, *pseudalbinum* u. a., oder die nur in manchen Jahren auftreten, in andern fehlen, also anscheinend jährlicher Neubildung unterliegen, z. B. *H. erythropodum* und *corruptum*.

Auch die Variationen oder Mutationen sind verschieden alt. Für die Bestimmung ihres Alters sind ihre Verbreitung und die Konstanz ihrer Merkmale massgebend. Eine vielleicht durch Variation entstandene Sippe ist das *H. chlorocephalum*. Da es aber ziemlich isoliert dasteht, so müssen wir in ihm jedenfalls eine alte Form erblicken. Auch die meisten andern besprochenen Variationen, z. B. *H. tubulosum*, *polymorphum* und *nigritum*, sind wahrscheinlich ziemlich alte Sippen. Jünger dagegen sind *H. decipiens* und *eximium* und solche Varietäten der Haupt- oder Zwischenformen, die noch nicht zu besonderer Selbständigkeit vorgeschritten sind.





Hauptarten



Variationen (Mutationen)



Primäre Bastarde



Sekundäre Bastarde



Steigende Reihen

1. Sectio

Alpina Fries

2. "

Subpulmonacea G. Schnd. (emend.)

3. "

Vulgata Fries

4. "

Caesia G. Schnd.

5. "

Pseudopseudanthoides G. Schnd. (emend.)

6. "

Pseudanthoides Fries

7. "

Alpestris Fries

Lebenslauf.

Ich, Ernst Benner, Sohn des Pastors Max Benner und seiner Gemahlin Agnes, geb. Drath, wurde am 11. April 1883 zu Troitschendorf, Kreis Görlitz, geboren. Von Ostern 1892 bis Ostern 1896 besuchte ich das Kgl. Gymnasium zu Wohlau in Schlesien und von Ostern 1896 ab das Kgl. Gymnasium zu Rawitsch, das ich Ostern 1901 mit dem Zeugnis der Reife verliess.

Dann studierte ich an der Kgl. Universität Breslau Naturwissenschaften und bestand am 31. Mai 1905 das Examen rigorosum.

Ich besuchte die Vorlesungen und Uebungen folgender Herren Professoren und Dozenten:

Ebbinghaus, Franz, Frech, Freudenthal, Herz, Hintze, Kükenthal, Ladenburg, O. E. Meyer, Neumann, Partsch, Pax, Riesenfeld, von Rümker, Sachs, Semrau, Volz.

Allen meinen verehrten Lehrern sage ich hierdurch herzlichen Dank. Zu besonderem Danke bin ich Herrn Professor Dr. Pax verpflichtet für das lebhafteste Interesse, das er mir während meines Studienganges und besonders bei der Ausführung der vorliegenden Arbeit entgegengebracht hat.

Thesen.

- 1) Der Endemismus der sudetischen Hieracienflora ist ein noch ziemlich junger.
- 2) Die Mutationstheorie von H. De Vries darf noch nicht als erwiesen angesehen werden.
- 3) Die Interglacialperioden der norddeutschen Ebene sind durch Oscillationen des nordischen Gletschereises hervorgerufen worden.